

۶۰ ml Syrup

گایافنزین

۶۰ میلی لیتر

هر پیمانه (۵ میلی لیتر) از شربت ۶۰ میلی لیتری گایافنزین حاوی ۱۰۰ میلی گرم گایافنزین می باشد، که در جعبه های یک عددی همراه با پیمانه و برگه راهنمای مصرف دارو عرضه می شود.

موارد و مقدار مصرف:

دسته دارویی: اکسپکتورانت (خلط آور)

درمان سرف:

کودکان ۶ ماه تا ۲ سال: ۲۵-۵۰ میلی گرم هر ۴ ساعت. حداقل دوز مجاز روزانه: ۳۰۰ میلی گرم.

کودکان ۲-۶ سال: ۵۰-۱۰۰ میلی گرم هر ۴ ساعت. حداقل دوز مجاز روزانه: ۶۰۰ میلی گرم.

کودکان ۱-۶ سال: ۱۰۰-۲۰۰ میلی گرم هر ۴ ساعت. حداقل دوز مجاز روزانه: ۱۲۰۰ میلی گرم.

کودکان بالای ۶ سال و بزرگسالان: ۲۰۰-۴۰۰ میلی گرم هر ۴ ساعت. حداقل دوز مجاز روزانه: ۴۰۰ میلی گرم.

راهنمایی های عمومی:

- این دارو برای بیماری تعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران، خودداری نمایید.

مصرف گایافنزین ممکن است سبب خواب آلودگی و تاری دید شود. لذا ضمن درمان از ایندیگ و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلاء به یک از مشکلات ذبل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید.

حساسیت به گایافنزین یا هر یک از اجزای دارو

صرف در دوران بارداری و شیردهی:

گایافنزین در دوران بارداری و شیردهی با احتیاط و زیر نظر پزشک مصرف شود.

هشدارها:

- در کودکان زیر ۲ سال زیر نظر پزشک مصرف شود.

- در صورت مصرف این دارو، اگر تا ۷ روز علائم سرفه بپیوند نیافت و یا در صورت وجود تب، راش پوستی با سرد و مدادوم با پزشک خود مشورت نمایید.

احتیاط های مصرف:

در صورت بروز سرفه های مزمن همراه با خلط (در افراد سیگاری، افراد مبتلا به آسم، برونشیت مزمن) قلل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

تدالک های دارویی:

هیچ تداخل دارویی ثبت نشده است.

نحوه صحیح مصرف دارو:

این دارو را با یک لیوان پر از آب مصرف نمایید.

عواض جانی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:

سرگیجه، سرد و راش پوستی، کهیر، نهوع، استغفار، ناراحتی گوارشی

مسومومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شایع نگهداری:

- دارو را در درجه سانتیگراد، دور از نور نگهداری و از بخ زدگی محافظت نمایید.

- دارو را در از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- بیچ قرارده بیارویی را طریق فاصلاب یا ریله های خانگی دور نزیبید. در مورد نحوه ای امکان آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محيط زیست می نمایند.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران
تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: مرداد ۱۳۹۷

آدرس: تهران، نگارخانه ۱، جاده مخصوص باغ، شورای اسلامی
خط آهنی: ۰۲۱-۰۲۶۸۱۷۸۵۳۰ | مسدود پستی: ۰۲۱-۰۲۶۵۰۰۰۰-۱۷ | فاکس: ۰۲۱-۰۲۶۸۱۷۸۵۳۰
E-mail: info@kharampharm.com | www.kharampharm.com