

Oral Drops

IROFANT[®]
ferrous Sulfate

قطره خوراکی

آیروفانت[®]
فروس سولفات

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این فرآورده، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

آنتی اسید های حاوی کلسیم و آلومینیوم، نمک های کلسیم، پانکراتین، رانتیتیدین، فاموتیدین، PPIs (امپرازول، پنتوپرازول، اس امپرازول، رایبرازول)، کابتوپریل، فلوروکینولون ها (سپیروفلوکساسین، لووفلوکساسین، موکسی فلوکساسین، جمی فلوکساسین، اوفلوکساسین)، لوودوبا، لووتیرو کسین، متیل دوبا، پنسیلامین، تتراسایکلین، داکسی سایکلین، مینوسایکلین.

نحوه صحیح مصرف:

آهن برای جذب بیشتر بهتر است با معده خالی مصرف شود. در صورت بروز عارضه گوارشی مثل تهوع می توان فرآورده را با غذا مصرف نمود.

عوارض جانبی:

هر فرآورده به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمائید:

تغییر رنگ دندان ها به صورت موقتی، درد شکمی (وابسته به دوز)، یبوست، اسهال، التهاب دستگاه گوارش، تهوع (وابسته به دوز)، استفراغ، تیرگی مدفوع.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

علائم مسمومیت شامل: تهوع، استفراغ، درد شکمی، اسهال، استفراغ خونی، خونریزی از مقعد، کاهش فشار خون و تکرر سلول های کبدی هم می تواند اتفاق بیافتد. کما، شوک و اسیدوز متابولیک سمیت شدید را نشان می دهد.

شرایط نگهداری:

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- فرآورده را در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید.

- فرآورده را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ی امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: اردیبهشت ۱۳۹۸



داروسازی خوارزمی
Kharazmi
Pharmaceutical Co.

آدرس: تهران، کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج، شهرک استقلال
خیابان چال، پلاک ۱۱۵ صندوق پستی: ۱۳۸۷۱۴۵۳
تلفن: ۰۲۱-۴۴۶۴۶۱۳۰-۱۷۱ info@kharazmipharm.com - www.kharazmipharm.com

ATW.021/LF.02/P

Oral Drops

IROFANT[®]
ferrous Sulfate

قطره خوراکی

آیروفانت[®]
فروس سولفات

هر ۱ میلی لیتر (۲۵ قطره) از قطره ۱۵ میلی لیتری آیروفانت[®] حاوی ۱۲۵/۱ گرم فرس سولفات هیتا هیدرات (معادل ۲۵ میلی گرم آهن المنتال) می باشد که در جعبه های یک عددی همراه با قطره چکان و برگه راهنمای مصرف عرضه می شود.

موارد و مقدار مصرف:

مقدار مصرف هر فرآورده را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول آن به شرح ذیل است:

کمک به پیشگیری و بهبود کم خونی ناشی از فقر آهن:

- کودکان ۳-۱۰ سال: ۷ قطره روزانه.

- کودکان ۸-۴ سال: ۱۰ قطره روزانه.

- کودکان ۱۳-۹ سال: ۸ قطره روزانه.

- دختران ۱۸-۱۴ سال: ۱۵ قطره روزانه.

- پسران ۱۸-۱۴ سال: ۱۱ قطره روزانه.

- خانم های ۵۰-۱۹ سال: ۱۸ قطره روزانه.

- آقایان و سالمندان بالای ۵۰ سال: ۸ قطره روزانه.

- زنان باردار: ۲۷ قطره روزانه.

- زنان شیرده: ۱۰ قطره روزانه.

راهنمایی های عمومی:

- این فرآورده برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران، خودداری نمایید.

- برای جلوگیری از تغییر رنگ دندان، قبل از مصرف، فرآورده را با مقداری آب رقیق نمایید و قطره چکان را در انتهای زبان بچکانید.

- برای جذب بهتر آهن، بهتر است همراه با ویتامین C مصرف شود.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید:

در صورت وجود هر گونه حساسیت نسبت به آهن یا هر یک از اجزای فرآورده با پزشک خود مشورت نمایید.

در صورت ابتلا به مشکلات هموگلوبینوز، هموسیدروز، آنمی همولیتیک در مورد مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت نمایید.

در افرادی که به صورت مداوم خون دریافت می کنند.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی زیر نظر پزشک مصرف شود.

هشدارها:

- در صورت کافی بودن سطح آهن خون، از مصرف طولانی مدت و همیشگی آهن بپرهیزید.

- در طی مصرف آهن به طور منظم سطح آهن خون بررسی شود. هموگلوبین در طی ۴-۳ هفته باید به مقدار ۲۰ گرم در لیتر یا ۲ گرم در ۱۰۰ میلی لیتر افزایش یابد. زمانی که هموگلوبین به حد نرمال رسید، درمان باید به مدت ۳ ماه دیگر برای افزایش ذخایر آهن ادامه یابد.

موارد احتیاط:

این فرآورده در افراد زیر با احتیاط مصرف شود:

- در افراد با سابقه زخم گوارشی و کولیت اولسراتیو.

- بین مصرف مکمل های کلسیم، رانتیتیدین، فاموتیدین، کابتوپریل، آنتی بیوتیک های فلوروکینولون، PPIs، لووتیرو کسین، آنتی بیوتیک های تتراسایکلین و این فرآورده باید چندین ساعت فاصله باشد.

ATW.021/LF.02/P