

کپسول (گراتولهای انتریک کوند)

پریزل گات® امپرازول ۲۰

Capsule (E.C. Granules)

PrizelGut® Omeprazole 20

کپسول پریزل گات® حاوی ۲۰ میلی گرم گراتول های انتریک کوند امپرازول می باشد که در قوطی های ۱۴ عددی درون جعبه همراه با برگه راهنمای مصرف دارو عرضه می شود.

مواد و مقدار مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

زخم دئودنال:

بزرگسالان: ۲۰ میلی گرم یک بار در روز برای ۴ هفته.

ازوفاژیت فرسایشی:

بزرگسالان: ۲۰ میلی گرم یک بار در روز برای ۴-۸ هفته.

زخم معده:

بزرگسالان: ۲۰ میلی گرم یک بار در روز برای ۴-۸ هفته.

سوزش سر دل:

بزرگسالان: ۲۰ میلی گرم روزانه برای ۱۴ روز.

رژیم دارویی هلیکوباکتر پیلوری همراه با کلاریترومایسین:

بزرگسالان: در ابتدا ۴۰ میلی گرم یک بار در روز برای ۱۴ روز. در صورت عدم بهبودی می توان دارو را به صورت ۲۰ میلی گرم روزانه برای ۱۴ روز دیگر ادامه داد.

رژیم دارویی هلیکوباکتر پیلوری همراه با کلاریترومایسین و آموکسی سیلین:

بزرگسالان: ۲۰ میلی گرم دو بار در روز برای ۱۰ روز. در صورت عدم بهبودی می توان دارو را به صورت ۲۰ میلی گرم یک بار در روز برای ۱۸ روز دیگر ادامه داد.

رفلاکس علامتی دستگاه گوارش (همراه با زخم مری):

بزرگسالان: ۲۰ میلی گرم یک بار در روز تا ۴ هفته.

پیشگیری از زخم های ناشی از استرس:

بزرگسالان: ۴۰ میلی گرم روزانه.

راهنمایی های عمومی:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

موارد منع مصرف:

در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به امپرازول یا هر یک از اجزای دارو یا پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

امپرازول در شیر ترشح شده و عوارضی برای کودک ایجاد می کند.

امپرازول در دوران بارداری و شیردهی فقط زیر نظر پزشک معالج مصرف شود.

هشدارها:

- استفاده طولانی مدت از امپرازول باعث گاستریت آتروفی (التهاب مزمن موزو معده که باعث کاهش سلول های ترشحی و جایگزینی آن ها با لایه های فیبری می گردد.

- در صورت کاهش منیزیم بدن در حین مصرف امپرازول، سریعاً دارو را قطع کرده و به پزشک مراجعه کنید.

- درمان طولانی مدت (بیش از دو سال) با امپرازول باعث سوء جذب ویتامین B_{۱۲} در بدن می شود که این علامت در خانم ها و افراد زیر ۳۰ سال بیشتر رخ می دهد.

- در طی مصرف امپرازول در صورت ابتلا به اسهال شدید غیر قابل بهبود، سریعاً دارو را قطع کرده و به پزشک مراجعه کنید. این عارضه می تواند مربوط به اسهال ناشی از کلستریدیوم دیفیسیل به علت مصرف امپرازول باشد.

- استفاده از امپرازول ریسک عفونت سالمونلاهی را افزایش می دهد.

- در صورت ابتلا به هرگونه اختلال کلیوی شدید در طی مصرف امپرازول، دارو را قطع کرده و سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.

- از مصرف همزمان امپرازول با داروهای کلویدوگرل (پلاویکس®)، ارلویتینیب، پیموزاید، پوساکوتازول، ریفاکسیمین، زیدرونیت، گیاه علف جای و وریکوتازول بپرهیزید.

- در صورت مصرف همزمان امپرازول و سیتالوپرام، حداکثر دوز مجاز روزانه سیتالوپرام در مصرف همزمان ۲۰ میلی گرم می باشد و در این صورت بیمار باید به طور مرتب جهت جلوگیری از سمیت سیتالوپرام ارزیابی شود. علامت سمیت: سندرم سروتونین و افزایش QT.

موارد احتیاط:

- امپرازول در افراد با سابقه شکستگی های ناشی از بوگی استخوان که به مدت طولانی یا با دوز بالا از امپرازول استفاده می کنند، با احتیاط مصرف شود. زیرا امپرازول ریسک شکستگی استخوان را افزایش می دهد و این افراد باید به طور مرتب ارزیابی شوند و در طی درمان از مکمل های کلسیم و ویتامین دی استفاده نمایند.

- امپرازول در افراد با اختلال کلیه باید با احتیاط مصرف شود و دوز دارو توسط پزشک معالج تنظیم گردد.

- در طی ۳ ماه تا یک سال از مصرف امپرازول احتمال هیپومیتزیمی (کاهش شدید منیزیم بدن) وجود دارد که عوارضی مانند تشنج و آریتمی ایجاد می کند. بنابراین در ابتدا و حین درمان طولانی مدت با امپرازول به طور مرتب باید سطح منیزیم خون اندازه گیری شود، خصوصاً در کسانی که در کنترل امپرازول از دیگوکسین، دیورتیک ها و سایر داروهای که سطح منیزیم خون را کم می کنند، استفاده می نمایند. که در این افراد باید حتماً مکمل منیزیم مصرف شود.

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نماید، پزشک خود را مطلع سازید: آریپیپرازول، زیدرونیت، کارودیلول، سیلوستازول، سیتالوپرام، کلیدوگرل، کلوزاپین، کلوزاپین، سیکلوسپورین، دایکاتران، ارلویتینیب، اس سیتالوپرام، فلوکوتازول، هیدروکدون، ایندیناپور، نمک های آهن، اینتراکتازول، کتوکوتازول، مزلامین، متوترکات، متیل فنیدیت، مایکوفنولات، فنی توفین، پیموزاید، پوساکوتازول، ریفاکسیمین، گیاه علف جای، تاکرولیموس، وارفارین، وریکوتازول.

نحوه صحیح مصرف دارو:

- امپرازول را قبل از غذا مصرف کنید.

- کپسول را به طور کامل بلعیده و از خوردن و جویدن آن بپرهیزید.

- در افرادی که توانایی بلع کپسول را ندارند، می توان کپسول را باز کرده و محتویات آن را با یک قاشق غذاخوری آب سبب مخلوط کرد. مخلوط تهیه شده را سریعاً با یک لیوان آب خنک مصرف کنید.

مخلوط تهیه شده را نباید جوید و یا خرد کرد و از نگهداری آن خودداری کرده و بلافاصله مصرف کنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمائید:

سردرد، درد شکمی، تهوع، اسهال، استفراغ، نفخ، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، یبوست، سرگیجه، راش پوستی، درد کمر، سرفه، تب (در کودکان ۲-۱۲ سال)، آگرانولوسیتوز، واکنش های آلرژیک (شوک آنافیلاکسی، آنژیوادم و...)، بی اشتها، اضطراب، دوپینی، خشکی چشم و دهان، یبوست، افزایش فشار خون، افزایش کراتینین، خون الکالین فسفاتاز، افزایش بیلی روبین، ALT و AST خون.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- دارو را از بسته بندی اصلی خود خارج نکنید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ی امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران

تاریخ آخرین بازمینی و تدوین: خرداد ۱۳۹۷



داروسازی خوارزمی
Kharazmi
Pharmaceutical Co.

آدرس: تهران، کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج، شهرک استقلال
خیابان چال، پلاک ۱۱۵ صندوق پستی: ۱۳۸۹۷۱۵۶۳
تلفن: ۰۲۱-۴۴۴۴۴۱۳۰-۱۷
www.kharazmipharm.com - info@kharazmipharm.com

ATW.033/LF.01/P

145x150 mm

PANTONE 280 C