

**قرص روکشدار**  
**کلسی-دی®**  
**کلسیم - D3**

F.C. Tablet

**Calcidi®**  
**Calcium D3**

- در بیماران با نارسایی قلبی  
- در بیماران با سینگ کلسیمی کلیه  
**تمام‌های دارویی:**  
 دیگوکسین، هیدروکلورات‌زید، تراسایکلین، داکسیکلین، میتوساکلین،  
 سیپروفلوکساسین، افولوکساسین، لوفولوکساسین، جمی فلوکساسین، لووپنروکسین،  
 کورتیکاراستروپرید (بریدنیزولون، هیدروکورتیزون، بتامترazon)، فراورده‌های حاری آهن و  
 زنك، بيس فووات‌ها (اندروپوت، ابیاندرونوت، وزدروزیک اسید)، رفامین،  
 ابرونازید، کتوکونازول، انتراکونازول، دالازول، اورلیستات  
**نحوه مصرف:**  
 فراورده‌ای بعد از غذا و با ۱ لیوان پر از آب مصرف نمایید.  
**عوارض جانبی:**  
 هر فراورده به موادهای مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته  
 نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نشی شود اما در صورت بروز آن با پزشک  
 یا داروساز مشورت نمایید.  
 هیبریکلسین (افزایش مقدار کلسیم در خون)، هیبریکلسی اوری (افزایش مقدار کلسیم در  
 ادرار)، واکنش‌های آرژیک، تشکیل سنگ کلسیمی کلی، بیوست، نفخ، نبوغ، درد  
 شکمی، اسهال، خارش، راش پوستی، کهپر، هیبریوفسفات‌امی (افزایش مقدار فسفات در  
 خون).  
**شایطنه‌داری:**  
 فراورده رادر دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.  
 فراورده رادر از دسترس کودکان نگهداری نمایید.  
 فراورده رادر بسته‌بندی اصلی خود نگهداری نمایید.  
 هیچ فراورده‌ای دارویی را از طریق فاضلاب با زبانه‌های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه  
 ای املاح آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط  
 زیست می‌نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران  
 تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: اردیبهشت ۱۳۹۸

آدرس: تهران، کیاپور ۱ جاده مخصوص کرج، شهرک استقلال  
 خیابان جلال، پلاک ۱۵ منطقه پشت: ۱۴۸۷۱۶۵۲۳  
 تلفن: +۹۱۰-۴۴۵۶۵۱۳-۱۷  
 info@kharazmipharm.com - www.kharazmipharm.com

هر قرص روکشدار کلسی-دی® حاوی ۱۲۵۰ میلی گرم کلسیم کربنات (معادل ۵۰۰  
 میلی گرم کلسیم المتنا) و ۲۰۰ واحد ویتامین D<sub>3</sub> است، که در جمهه های ۱۰۰ عددی  
 (بلیسترهای ۱۰ عددی) و ۳۰ عددی (بلیسترهای ۱۰ عددی) همراه با برگ راهنمای  
 مصرف، داخل هر جعبه تولید و عرضه می‌شود.

**موارد و مقدار مصرف:**  
 - کمبود کلسیم و ویتامین D در بزرگسالان  
 - کمک به پیشگیری و درمان بوکی استخوان، نرمی استخوان، بیماری ریکت  
 (کمبود ویتامین D کلسیم و فسفات در بدن)  
 بزرگسالان: وزن اند ۱-۲ قرص بر اساس نیاز مصرف شود.

**موارد منع مصرف:**  
 در صورت ابتلاء به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید:  
 - حساسیت به ویتامین D و کلسیم و یا هر یک از اجزای دارو  
 در صورت بالا بودن سفلج ویتامین D بدن، هیبریکلسین (بالا بودن کلسیم خون)،  
 هیبریوفسفات‌امی (بالا بودن فسفات خون)-هیبریکلسی اوری (بالا بودن مقدار کلسیم در  
 ادرار)  
 - شایطنه‌ای که باعث هیبریکلسین اوری یا هیبریکلسیم می‌شود (فعالیت زیاده  
 پاراتیروپید، بیماری مغز استخوان، تومور بدھیم استخوان)  
**مصرف در دوران بارداری و شیردهی:**  
 کلسی-دی® در دوران بارداری و شیردهی زیر نظر پزشک معالج می‌تواند مصرف شود.  
**هشدارها:**  
 - قبل از مصرف و در طی درمان با کلسی-دی®، کلسیم خون و ادرار به طور منظم ارزیابی  
 شود.  
 - بین مصرف کلسی-دی® و فراورده‌های حاوی آهن و زینک باید دو ساعت فاصله باشد.  
 - کلسی-دی® باید دو ساعت قبل یا ۶ ساعت بعد از مصرف انتی بیوتیک‌های کینولون  
 (سیپروفلوکساسین، لووپنروکسین، و تراسایکلین ها (داکسیکلین،  
 میتوساکلین...) مصرف شود.  
 - بین مصرف کلسی-دی® و بیس فسفونات‌ها (اندروپوت، ابیاندرونوت، زولمرونیک  
 اسید...) باید یک ساعت فاصله باشد.  
 - بین مصرف کلسی-دی® و غذایی غنی از اگزالیک اسید (ریواس، اسفننج) فسفات  
 (سیوس)، فیتیک اسید (همه غلات) باید دو ساعت فاصله باشد.  
**احتیاط‌های مصرف:**  
 کلسی-دی® در افراد زیر با احتیاط مصرف شود:  
 - در افراد با ساقله سار کوئیدوز  
 - در بیماران با اختلال کلیوی

ATW.129/LF.0/P

145x150 mm

PANTONE 280 C