

سیتالوپرام ۲۰

F.C.Tablet

Citalopram 20

۱-راهنمای عمومی:
این دارو برای بیماری عقلي شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

۲-موارد احتیاط:
قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمایید:

- وجود هر گونه حساسیت - بارداری یا شیردهی
- استفاده از سایر داروها - ابتلاء ببیماری های دیگر
- اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

۳-موارد و مقدار مصرف دارو:

مقاره مصرف قرص سیتالوپرام ۲۰ باسته به شرایط بیماری و بیمار توسط پزشک معالج تجویز می شود.

مقادیر مصرف عمومی:

ضد افسردگی:

- بیار گسلان: در ابتداء ۲ میلی گرم یک بار روزانه. پزشک ممکن است دوز دارو را بر حسب افزایش دوره ۳ الی ۴ هفته می باشد.

- سالماندان: در ابتداء ۱۰-۲۰ میلی گرم یک بار روزانه. پزشک ممکن است دوز دارو را بر حسب نیاز و به صورت تدریجی افزایش دهد. حداکثر دوز مصرفی ۴۰ میلی گرم در روز می باشد.

ضد اضطراب:

- بیزرسالان: در ابتداء ۱۰ میلی گرم روزانه. پزشک ممکن است دوز دارو را بر حسب صورت تدریجی بین ۲۰ الی ۴۰ میلی گرم افزایش دهد. حداکثر دوز مصرفی ۴۰ میلی گرم در روز و فاصله افزایش دوره ۳ الی ۴ هفته می باشد.

- سالماندان: در ابتداء ۱۰ میلی گرم یک بار روزانه. پزشک ممکن است دوز دارو را بر حسب نیاز و به صورت تدریجی افزایش دهد. حداکثر دوز مصرفی ۴۰ میلی گرم در روز می باشد.

توجه:

- داروساز مبتلا به نارسایی کبدی دوز شروع کمتر خواهد بود و حداکثر دوز روزانه ۲۰ میلی گرم می باشد.

۴-نموده مصرف:

- دوره درمان را کامل تکید و دارو را راس ساعت به همراه یک لیوان آب میل نمایید.
دارو را می توانید همراه یا بدون غذامیل نمایید.

- از قطع مصرف دارو بدون اطلاع پزشک معالج خودداری نمایید.
از زمان شروع مصرف تا شروع بهدوی ممکن است ۴ هفته به طول انجامد. جهت بررسی روند بهدوی لازم است که به طور منظم به پزشک خود مراجعت کنید. لذا ممکن است مجرور به مصرف دارو به مدت ۶ ماه یا بیشتر باشد.

۵-موارد منع مصرف:

- مشکلات قلبی (طولانی بودن QT)

۵-صرف در بارداری و شیردهی:
شیردهی: فراورده در شیر مادر ترشح می شود و لازم است با احتیاط و تحت نظر پزشک معالج مصرف شود.

بارداری: مصرف این دارو در خانم های باردار مطالعه نشده است. در صورت بارداری با احتمال آن قبل از مصرف دارو با پزشک مشورت نمایید.

۶-هشدارها:

- در بیماران قلبی مشکوک به طولانی بودن QT با احتیاط مصرف شود.

۷-موارد احتیاط:

- مصرف این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی شود. لذا ضمن دمان با این دارو از راندگی و یا کار با ماشین اانی که بازی به هوشیاری کامل دارد خودداری نمایید.

- از قطع مصرف دارو بدون اطلاع پزشک معالج خودداری نمایید.

- این دارو در بعضی از افراد ممکن است باعث بی قراری، تحریک بدیری یا سری رفتارهای غیرعادی شود همچنین در برخی از افراد ممکن است تغیر و تعامل به خود ^۴ یا شدیدتر شدن افسردگی را موجب شود. در صورت مشاهده این علامت پزشک معالج را مطلع سازید.

- همچنین این دارو در برخی افراد ممکن است سبب خواب آلودگی، اختلال در افکار و اختلال در حرکات شود.

۸-تداخلات داروهای:

قبل از شروع درمان پزشک خود را در صورت مصرف داروهای ذیل مطلع سازید:
داروکستین، دومسیریدون، سیزراپاید، هیدروکسی زین، انداسترون، کواپایان، موکسی

فلوکسپاراسین، متوكلوپرامید، کلوپیدول، اسپیرین، فینگولیمود، لیتیوم، ترامادول، رسپیریدون، آپیکالان، دولوکستین، توبوپاریدین، ازپتروماپیسین، سلکوکسیپ، کاربودیلون، کربپروپارین، کاربامازین، سایمنیدین، کلوژایین

۹-عارضات جانبی دارو:

تعییر طعم دهان، کاهش توانایی و میل جنسی، افزایش با کاهش ضربان قلب،

گیجی، سرفه، خواب آلودگی، خشکی دهان، تهوع سستی، اختلال در خواب درد شکمی، اضطراب، ایزیش بینی بینی قفاری، تاری دید، گیجی، نب، تکر ادرار و افزایش مقدار ادرار، کاهش احساسات، کاهش حافظه، تعییر در سیکل قاعدگی، راش پوستی با خارش، اختلال در تنفس، سرمهد افزایش با کاهش وزن، طولانی شدن QT، کاهش فشار خون در زمان تعییر وضعیت

عارض قطع مصرف دارو:

اضطراب، گیجی، عصبانیت، ترس یا لرز

۱۰-طرفیت اینهداری:

- دارو را در میان کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازنی: فوریه ۱۳۹۸

آدرس: تهران، گلوبنر ۹ جاده مخصوص کرج ، شهرک استقلال
فایبان جال بنا ۱۱۰ مددوی پستی: ۱۳۸۷۱۲۵۶۳ تلف: ۰۲۱-۴۰۶۰۶۱۱۰-۱۷-۱
info@kharazmipharm.com - www.kharazmipharm.com

