

Scored Tablet

Clonazepam 1 & 2

قرص خط دار

کلونازپام ۱ و ۲

۶- هشدارها:

از مصرف در پورفیری حاد، انسداد مسیر تنفسی، آسیب مغزی - نخاعی، افسردگی، افراد با سابقه اقدام به خودکشی خودداری شود.

۷- موارد احتیاط:

مصرف این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی شود، لذا ضمن درمان با این دارو از رانندگی و یا کار با ماشین الاتی که نیاز به هوشیاری کامل دارد خودداری نمایید.

از قطع ناگهانی مصرف دارو خودداری نمایید.

۸- تداخلات دارویی:

قبل از شروع درمان پزشک خود را در صورت مصرف داروهای ذیل مطلع سازید:

الکل، آمیودارون، آنتی هیستامین ها، لریپرامین، کلوزاپین، هالوپریدول، الیزاپین، کوتیپین، رسیپریدون

باکلوفن، داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای (آمی تریپتیلین، کلومیپرامین)، ایمانتینیب، لاموتریزین، اریترومايسين

۹- عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

مهمترین این عوارض عبارتند از: اضطراب، گیجی (به ویژه در سالخوردگان)، ضربان تند و نامنظم قلب، افسردگی روانی، توهم، خواب آلودگی، ضعف عضلانی، حرکات غیر قابل کنترل بدن از جمله چشم ها، اشکال در به خواب رفتن، کبودی و خون ریزی عادی، بتورات جلدی، زخم در دهان یا در گلو.

۱۰- شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

دارو، دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ی امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: فروردین ۱۳۹۸

کلونازپام ۱ و ۲، قرص های خوراکی خط دار هستند که حاوی ۱ و ۲ میلی گرم کلونازپام می باشند. کلونازپام ۱ و ۲ در پلیسترهای ۱۰ عددی، در جعبه های ۱۰۰ عددی (۱۰ پلیستر) به همراه بروشور، توسط شرکت داروسازی خوارزمی به بازار عرضه می شود.

۱- راهنمایی عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمایید:

- وجود هر گونه حساسیت - بارداری و یا شیردهی

- استفاده از سایر داروها - ابتلا به بیماری های دیگر

- اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

۲- موارد و مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف قرص کلونازپام ۱ و ۲ بسته به شرایط بیماری و بیمار تجویز می گردد و تجویز از دوز کم شروع و در صورت نیاز توسط پزشک معالج افزایش می یابد.

مقدار مصرف عمومی:

ضد تشنج:

- بزرگسالان: ۱ میلی گرم یک بار در روز به مدت ۴ شب، دوز طی ۲-۴ هفته قابل افزایش می باشد. حداکثر مقدار مصرف دارو ۸-۴ میلی گرم در روز است.

- نوزادان و کودکان: مقدار مصرف دارو توسط پزشک تعیین می شود.

ضد اضطراب:

- بزرگسالان: ۲-۱ میلی گرم روزانه

۳- نحوه مصرف:

- دوره درمان را کامل کنید و دارو را راس ساعت به همراه یک لیوان آب میل نمایید.

- از قطع مصرف دارو بدون اطلاع پزشک معالج خودداری نمایید.

- در صورت فراموشی یک نوبت دارو به محض یاد آوردن آن را مصرف نمایید و در صورت گذشتن بیش از ۱ ساعت از زمان مقرر، از مصرف نوبت فراموش شده خودداری نمایید و دوز بعدی را در زمان مقرر مصرف کنید.

- از آنجایی که این دارو سبب ایجاد وابستگی می شود، لذا از مصرف دارو بیش از مقدار توصیه شده و یا مدت زمان توصیه شده توسط پزشک خودداری نمایید.

۴- موارد منع مصرف:

- کما

- دپرسیون تنفسی

- اعتیاد به الکل و مواد مخدر

۵- مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف دارو در دوران بارداری و شیردهی در این دوران توصیه نمی شود و مصرف آن تنها تحت نظر پزشک معالج امکان پذیر می باشد.



داروسازی خوارزمی
Kharazmi
Pharmaceutical Co.

آدرس: تهران، کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج، شهرک استقلال
خیابان جلال، پلاک ۱۵ | صندوق پستی: ۱۳۹۷۱۶۵۶۳
تلفن: ۰۲۱-۴۶۵۳۴۴۱۳-۱۷ | www.kharazmipharm.com
info@kharazmipharm.com

ATW.097/LF.0/P