

قرص دیفنوکسیلات

Tablet Diphenoxylate

هر قرص خوراکی حاوی دیفنوکسیلات (۲.۵ میلی گرم) توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و در جعبه های ۱۰۰ عددی (۱۰ پلیستر ۱۰ عددی) به همراه بروشور به بازار عرضه می شود.

۱- راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمایید:

- وجود هر گونه حساسیت - بارداری و یا شیردهی
- استفاده از سایر داروها - ابتلا به بیماری های دیگر

۲- موارد و مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو بسته به شرایط بیماری و بیمار تجویز می گردد مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند.

مقدار مصرف عمومی:

ضد اسهال (ضد حرکات دودی روده):

- بزرگسالان:

در اسهال حاد شروع درمان ۱۰ میلی گرم روزانه و سه بار در روز می باشد، که در صورت نیاز ۵ میلی گرم هر ۶ ساعت میزان دوز قابل افزایش می باشد و با کاهش علائم اسهال، میزان دوز کاهش می یابد. حداکثر دوز روزانه ۲۰ میلی گرم می باشد.

- کودکان:

مصرف این دارو در کودکان زیر ۱۲ سال توصیه نمی شود، در کودکان ۱۶-۱۲ سال: ۵

میلی گرم سه بار در روز

سالمندان: همانند دوز مصرف بزرگسالان می باشد.

۳- نحوه مصرف:

- از مصرف این دارو پیش از مقدار و مدت توصیه شده توسط پزشک خودداری کنید.
- دارو را با غذا مصرف کنید تا تحریک معده کاهش یابد.
- در صورت فراموشی یک نوبت مصرف دارو به محض یاد آوری آن را مصرف ننمایید ولی چنانچه تقریباً نوبت بعدی فرا رسیده بود آن را مصرف نکرده و از ۲ برابر کردن مقدار دارو نیز خودداری ننمایید.

۴- موارد منع مصرف:

در بیماران مبتلا به برفان، انسداد روده و همچنین اسهال ناشی از اندوتوکسین باکتریایی منع مصرف دارد.

۵- مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری: مصرف در دوران بارداری بدون تجویز پزشک توصیه نمی شود.
شیردهی: دیفنوکسیلات و اتروپین در شیر مادر ترشح می شوند و احتمال ایجاد عوارض جانبی جدی در شیرخواران وجود دارد لذا مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی

شود.

۶- هشدارها:

- در اسهال مزمن چنانچه با مصرف حداکثر مقدار دارو (روزانه ۲۰ میلی گرم دیفنوکسیلات) تا ۱۰ روز بهبودی مشاهده نشد، درمان بایستی متوقف شود.

- دارو با توجه به مکانیسم مهار حرکات دودی روده ممکن است باعث احتیاس مایعات در شکم و تشدید دهیدراتاسیون (کمی آب بدن) و تخلیه الکترولیت ها و تغییر پاسخ بدن به

درمان گردد. لذا در صورت بروز این موارد بایستی مصرف دارو را قطع نمود.
-در بیماران مبتلا به گولیت زخمی حاد، بایستی بلافاصله در صورت مشاهده اتساع شکم یا

بروز علائم گوارشی نظیر بی اشتها، نفخ، یبوست، تهوع و استفراغ یا درد شکمی درمان با دیفنوکسیلات قطع شود.

-در طی دوره درمان از مصرف الکل و یا داروهای تضعیف سیستم اعصاب مرکزی اجتناب ننمایند.

۷- موارد احتیاط:

-مصرف این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی شود. لذا ضمن درمان با این دارو از رانندگی و یا کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری کامل دارد خودداری نمایید.

-در صورت نیاز به هر گونه جراحی یا اعمال دندانپزشکی مصرف این دارو را به پزشک معالج اطلاع دهید.

-دارو را بیش از مقدار تجویز شده توسط پزشک مصرف نکنید زیرا استفاده طولانی مدت و یا خودسرانه از این دارو بیش از دوز درمانی معمول ممکن است منجر به وابستگی جسمی

بیمار به دارو گردد و بیمار را نسبت به اثر ضد اسهال این دارو مقاوم نماید.
-این دارو ممکن است تنفس را خصوصاً در افراد سالمند و بسیار ناتوان و بیمارانی که مشکل

تنفسی دارند شدیداً تضعیف نماید لذا کاهش و تنظیم دوز در این بیماران مورد نیاز می باشد.

-در درمان اسهال حاد مصرف دارو بایستی ۲۴ تا ۴۸ ساعت ادامه یابد و چنانچه اسهال تا ۴۸ ساعت ادامه یافت یا تب بیمار افزوده شد، به پزشک مراجعه ننمایند.

۸- تداخلات دارویی:

الکل، داروهای مضعف سیستم اعصاب مرکزی، آنتی کولینرژیکها و ضد دردهای مخدر (اوپیوئیدها)

- داروهای مهار کننده مونو آمینو اکسیداز (MAOI) مانند فلورازولیدون، پروکاربازین و سلزیلین و نیز نالتروکسون

۹- عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز هر یک از آن ها

ضمن قطع مصرف دارو با پزشک مشورت شود:

- عوارضی با شیوع کم و نادر که نیاز به توجه پزشکی دارند:

التهاب پانکراس با علائم درد شکمی شدید، درد کمر، تب، کاهش اشتها، تهوع یا استفراغ، ایلئوس پارالیتیک، مگاکولون سمی یا علائم نفخ و یبوست، کاهش اشتها، درد شدید معده

- عوارضی با شیوع کم و نادر که تنها در صورت تداوم بدتر شدن و آزردهی بیمار نیاز به توجه پزشکی دارند:

اثرات خفیف آنتی کولینرژیک (شامل تاری دید، مشکل در ادرار کردن، خشکی پوست و دهان و تب)، تضعیف سیستم اعصاب مرکزی (سرگیجه، منگی، خواب آلودگی، ضعف قوای ذهنی) گیجی، سردرد هائپرترمیا (افزایش دمای بدن) با علائم گرگرفتگی، تنفس و ضربان قلب سریع، بی حسی دست و پا، بثورات پوستی یا خارش، تورم لته

- عوارضی که بندرت در اثر قطع مصرف طولانی مدت دارو ممکن است مشاهده شوند و نیاز به توجه پزشکی دارند:

افزایش تعریق، انقباضات عضلانی، تهوع یا استفراغ، لرزیدن و انقباضات معده

۱۰- شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
-حور از دسترس کودکان نگهداری شود.

-از مصرف داروهای تاریخ گذشته جدا خودداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران
تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: خرداد ۱۳۹۸



داروسازی خوارزمی
Kharazmi
pharmaceutical Co.

آدرس: تهران، کیانوش ۹، جاده مخصوص کرج، شهرک استقلال
خیابان جلال، پلاک ۱۱۵
تلفن: ۰۲۱-۴۲۵۶۵۳۱۳-۱۷
www.kharazmipharm.com - info@kharazmipharm.com

ATW.007/LF.0/P