

قرص روکشدار

مترونیدازول

هر قرص روکش دار مترونیدازول حاوی ۲۵۰ میلی گرم مترونیدازول می باشد که در پلیسترهای ۱۰ عددی و در جعبه های ۱۰۰ عددی همراه با برگه راهنمای مصرف دارو عرضه می شود.

هر قرص روکش دار مترونیدازول حاوی ۵۰۰ میلی گرم مترونیدازول می باشد که در پلیسترهای ۱۰ عددی و در جعبه های ۲۰ عددی همراه با برگه راهنمای مصرف دارو عرضه می شود.

موارد و مقدار مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

درمان عفونت آمیبی حاد:

کودکان: ۵۰-۳۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن روزانه در ۳ دوز منقسم برای ۱۰-۷ روز.

بزرگسالان: ۷۵۰ میلی گرم، ۳ بار در روز برای ۱۰-۵ روز.

درمان آبسه کبدی آمیبی:

بزرگسالان: ۷۵۰-۵۰ میلی گرم، ۳ بار در روز برای ۱۰-۵ روز.

درمان عفونت های بی هوازی:

بزرگسالان: دوز معمول، ۵۰۰ میلی گرم هر ۶ ساعت برای ۱۰-۷ روز. حداکثر دوز مجاز روزانه: ۴ گرم. (عفونت استخوان، مفاصل، دستگاه تنفسی تحتانی و اندوکاردیوم به درمان طولانی تری نیاز دارد.)

درمان واژینوز باکتریایی:

بزرگسالان: ۵۰۰ میلی گرم، ۲ بار در روز برای ۷ روز.

درمان عفونت تریکوموناس:

درمان بیمار و شریک جنسی:

۱ روز درمان: دوز معمول، ۲ گرم به صورت تک دوز یا ۱ گرم، ۲ بار در روز در همان روز، ۷ روز درمان: دوز معمول، ۲۵۰ میلی گرم، ۳ بار در روز برای ۷ روز یا ۵۰۰ میلی گرم، ۲ بار در روز برای ۷ روز.

درمان عفونت هلیکو باکتریلوری:

بزرگسالان: درمان سه تایی: ۵۰۰ میلی گرم، ۲ بار در روز در ترکیب با کلاریترومایسین و یک PPIs برای ۱۴-۱۰ روز.

درمان ۴ تایی: ۲۵۰ میلی گرم، ۴ بار در روز در ترکیب با بیسموت، تتراسایکلین و یک PPIs برای ۱۴-۱۰ روز.

درمان عفونت دهان و دندان:

بزرگسالان: دوز معمول، ۲۵۰ میلی گرم هر ۸ ساعت برای ۱۰ روز به همراه آموکسی سیلین.

F.C. Tablet

Metronidazole

درمان عفونت کلستریدیوم دیفیسیل:

بزرگسالان: ۵۰۰ میلی گرم، ۳ بار در روز برای ۱۴-۱۰ روز.

راهنمایی های عمومی:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران، خودداری نمایید.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید:

-در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به مترونیدازول یا هر یک از اجزای دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

-در طی ۳ ماهه اول بارداری در بیماران مبتلا به عفونت تریکوموناس

-در افراد با سابقه مصرف دی سولفیپرام در طی ۲ هفته گذشته

-در افراد با سابقه مصرف فرآورده های حاوی الکل و پروپیلن گلالیکول در طی درمان و تا ۳ روز بعد از قطع مصرف مترونیدازول. زیرا مصرف همزمان باعث بروز واکنش های شبه دی سولفیپرام می شود: کرامپ های شکمی، تهوع، استفراغ، سردرد، گرگرفتگی.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

از مصرف دارو در دوران بارداری (به خصوص ۳ ماهه اول) بپرهیزید مگر زیر نظر پزشک معالج.

از مصرف دارو در زمان شیردهی بپرهیزید مگر زیر نظر پزشک معالج.

هشدارها:

اگر در طی مصرف طولانی مدت مترونیدازول و یا مصرف در دوزهای بالا دچار عوارض زیر شدید، دارو را قطع کرده و سریعاً به پزشک مراجعه نمایید:

مننژیت غیر عفونی (علائم می تواند در طی ساعت ها بعد از مصرف دارو بروز پیدا کند)، انسفالوپاتی (سمیت مغزی همراه با عدم کنترل حرکات بدن، سرگیجه، اختلال در تکلم)، تشنج، نوروپاتی محیطی (بی حسی و گزگز اندام ها) و آسیب اعصاب چشم.

-مترونیدازول می تواند با تست های آزمایشگاهی زیر تداخل کند: ALT •AST،

تری گلیسرید، گلوکز و LDH.

قرص روکشدار

مترونیدازول

موارد احتیاط:

-مترونیدازول در افراد با سابقه تشنج یا احتیاط مصرف شود.

-مصرف طولانی مدت (بیش از دو ماه) مترونیدازول می تواند باعث کولیت سودوممبران و عفونت های کاندیدیایی شود.

-قبل از شروع درمان، در طی مصرف دارو و پس از درمان با مترونیدازول آزمایش شمارش گلبول های قرمز خون انجام شود.

-مترونیدازول در افراد با اختلال شدید کبدی و کلیوی با احتیاط مصرف شود.

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

الکل و فرآورده های حاوی الکل (به دلیل ایجاد واکنش شبه دی سولفیپرام)، بوسولفان، کیسیتائین، دی سولفیپرام، فلورواوارسیل، میندازول (از مصرف همزمان این دو دارو بپرهیزید)، مایکوفنولات، فنوباریتال، فنی تونین، پریمیدون، ریتوناویر (از مصرف همزمان این دو دارو بپرهیزید)، واکسن BCG داخل مثانه، وارفارین، دیزوپیرامید، پروکائین آمید، کینیدین، سوتالول، کلرپرومازین، سیتالوپرام، کلاریترومایسین، پیموزاید، تیوریدازین، زیراسیدون.

نحوه صحیح مصرف دارو:

مترونیدازول برای کاهش عوارض گوارشی بهتر است همراه با غذا مصرف شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

سردرد، تهوع، التهاب واژن، سرگیجه، طعم فلزی در دهان، خارش ناحیه زنییتال، درد شکمی، خشکی دهان، دیسی منوره، عفونت دستگاه ادراری، عفونت باکتریایی و کاندیدیایی، علائم شبه آنفلوآنزا، التهاب گلو، آبریزش بینی، سینوزیت، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، احتقان بینی، پلای اوری، ضعف ماهیچه ها، تب، نوتروپنی (کاهش تعداد نوتروفیل ها) برگشت پذیر، خشکی واژن، کاهش میل جنسی، راش پوستی، سندرم استیونس-جانسون، بی اشتهایی، پیوست، کهیر، استفراغ، تشنج.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک ویا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

F.C. Tablet

Metronidazole

شرایط نگهداری:

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- دارو را در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ی امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران – ایران

تاریخ آخرین بازمینی و تدوین: خرداد ۱۳۹۷



داروسازی خوارزمی
Kharazmi
pharmaceutical Co.

آدرس : تهران ، کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج ، شهرک استقلال
شهبان جلال ، پلاک ۱۱۵ مندوق پستی: ۱۳۸۹۷۱۶۶۳
تلفن : ۰۲۱- ۴۴۵۴۱۳-۱۷ www.kharazmipharm.com
 info@kharazmipharm.com



داروسازی خوارزمی
Kharazmi
pharmaceutical Co.

آدرس : تهران ، کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج ، شهرک استقلال
شهبان جلال ، پلاک ۱۱۵ مندوق پستی: ۱۳۸۹۷۱۶۶۳
تلفن : ۰۲۱- ۴۴۵۴۱۳-۱۷ www.kharazmipharm.com
 info@kharazmipharm.com

ATW.082/LF.0/P

ATW.082/LF.0/P