

قرص روکش دار

روستاتین® رزوواستاتین

هر قرص روکش دار روستاتین® حاوی ۵ میلی گرم رزوواستاتین (به صورت کلسیم) می باشد که در پلیسترهای ۱۰ عددی و در جعبه های ۳۰ عددی همراه با برگه راهنمای مصرف دارو عرضه می شود.

هر قرص روکش دار روستاتین® حاوی ۱۰ میلی گرم رزوواستاتین (به صورت کلسیم) می باشد که در پلیسترهای ۱۰ عددی و در جعبه های ۳۰ عددی همراه با برگه راهنمای مصرف دارو عرضه می شود.

هر قرص روکش دار روستاتین® حاوی ۲۰ میلی گرم رزوواستاتین (به صورت کلسیم) می باشد که در در پلیسترهای ۱۰ عددی و در جعبه های ۳۰ عددی همراه با برگه راهنمای مصرف دارو عرضه می شود.

موارد و مقدار مصرف:

دسته دارویی: عوامل کاهش دهنده لیپید (استاتین ها)

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

درمان افزایش کلسترول خون:

بزرگسالان: دوز معمول به صورت ۴۰-۵ میلی گرم روزانه می باشد.

درمان افزایش تری گلیسرید خون و اختلالات دیس لیپیدمی:

بزرگسالان: دوز معمول به صورت ۴۰-۵ میلی گرم روزانه می باشد.

پیشگیری اولیه از وقایع قلبی-عروقی در بیمارانی که در ریسک مشکلات قلبی-عروقی قرار دارند:

در افراد بزرگسال با HDL-C> 190 mg/dl : ۴۰-۲۰ میلی گرم روزانه.

در افراد ۷۵-۴۰سال و مبتلا به دیابت نوع ۱و ۲: ۱۰-۵ میلی گرم روزانه.

در افراد ۷۵-۴۰سال و مبتلا به دیابت نوع ۱و ۲ و سابقه ابتلا به بیماری آترواسکلروزیس: ۴۰-۲۰ میلی گرم روزانه.

در افراد ۷۵-۴۰ سال و سابقه ابتلا به بیماری آترواسکلروزیس: ۴۰-۵ میلی گرم روزانه.

پیشگیری ثانویه از وقایع قلبی-عروقی:

بزرگسالان: دوز معمول: ۴۰-۵ میلی گرم یک بار در روز.

راهنمایی های عمومی:

- این دارو برای بیماری قلبی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران، خودداری نمایید.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید:

-در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به رزوواستاتین یا هر یک از اجزای دارو یا پزشک خود مشورت نمایید.

-در صورت ابتلا به بیماری های فعال کبدی یا افزایش نا شناخته آنزیم های ترانس آمیناز کبدی در مورد مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

-در صورت بارداری یا شیردهی

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران در دوران بارداری و شیردهی ممنوع است، مگر طبق صلاحدید پزشک معالج.

هشدارها :

- حین مصرف دارو، در صورت بروز علائم شدید ماهیچه ای یا خستگی، دارو را قطع کرده و سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.

-اگر در طی مصرف دارو، مقدار آنزیم های ترانس آمیناز کبدی و ALT و AST بیش از ۳ برابر بالاترین حد نرمال بود باید دارو را قطع کرده و بلافاصله به پزشک مراجعه نماید.

F.C. Tablet

Rostatin® Rosuvastatin رزوواستاتین

هر قرص روکش دار روستاتین® حاوی ۵ میلی گرم رزوواستاتین (به صورت کلسیم) می باشد که در پلیسترهای ۱۰ عددی و در جعبه های ۳۰ عددی همراه با برگه راهنمای مصرف دارو عرضه می شود.

هر قرص روکش دار روستاتین® حاوی ۱۰ میلی گرم رزوواستاتین (به صورت کلسیم) می باشد که در پلیسترهای ۱۰ عددی و در جعبه های ۳۰ عددی همراه با برگه راهنمای مصرف دارو عرضه می شود.

هر قرص روکش دار روستاتین® حاوی ۲۰ میلی گرم رزوواستاتین (به صورت کلسیم) می باشد که در در پلیسترهای ۱۰ عددی و در جعبه های ۳۰ عددی همراه با برگه راهنمای مصرف دارو عرضه می شود.

موارد احتیاط:

رزوواستاتین در افراد زیر با احتیاط مصرف شود:

-در بیماران با نارسایی کلیوی

-در افرادی که مصرف کننده الکل هستند.

-در افراد با سابقه بیماری های کبدی و علائم آسیب کبدی (یرقان، افزایش آنزیم ترانس آمیناز کبدی)

-در کودکان زیر ۱۰ سال

-در سالمندان بالای ۶۵ سال (به علت ریسک بروز میوپاتی)

-رزوواستاتین ممکن است در تست های اندازه گیری سطح گلوکز ناشتا خون و HbA_{1c} تداخل ایجاد کرده و باعث افزایش آن شود.

-در بیماران باید قبل از شروع مصرف رزوواستاتین، ۱۲ هفته پس از مصرف و پس از هر بار افزایش دوز و سپس سالانه، تست های ارزیابی عملکرد کبدی سنجیده شود.

-در بیماران باید ۴-۲ هفته پس از شروع دوز اولیه یا تغییر دوز، مقدار لیپید خون اندازه گیری شود.

-بیماران در ماه های ابتدایی شروع درمان و در طی هر دوره افزایش دوز دارو، باید برای علائم میوپاتی و آسیب ماهیچه ای (درد ماهیچه، حساسیت به لمس، ضعف ماهیچه و افزایش آنزیم کراتین فسفوکیناز(CPK) بیش از ۱۰ برابر بالاترین حد نرمال) ارزیابی شوند.

-فاکتورهای ریسک بروز میوپاتی: سن بالای ۶۵ سال، جنس مونث، کم کاری هورمون تیروئید کنترل نشده و نارسایی کلیه.

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سـازینـد:

آنتی اسید (حداقل دو ساعت بعد از مصرف رزوواستاتین مصرف شود)، ضد قارچ های آزول (فلوکنازول، ایتراکنازول، کنوکنازول، پوساکونازول، ورینکنازول)، کلشی سین، سسیکلوسپورین (در این صورت حداکثر دوز مجاز روزانه رزوواستاتین ۵ میلی گرم می باشد)، دیگوکسین، وارفارین، فیربات ها (فتوفیرات، جم فیبروزیل)(در صورت مصرف همزمان، رزوواستاتین نباید بیش از ۱۰ میلی گرم روزانه مصرف شود)، نیاسین (نیکوتینیک اسید) در صورت مصرف حداقل ۱ گرم روزانه، داروهای مهارکننده آنزیم پروتئاز ویروسی (نلفیناویر، ریتوناویر)(در صورت مصرف همزمان، رزوواستاتین نباید بیش از ۱۰ میلی گرم روزانه مصرف شود)، قرص های ضد بارداری خوراکی، اریترومایسین، اسپیریتولاکتون، سلیمتیدین.

قرص روکش دار

روستاتین® رزوواستاتین

نحوه صحیح مصرف دارو:

بهتر است دارو شب ها در یک ساعت مشخص مصرف شود.

این دارو را با یک لیوان آب و همراه یا بدون غذا مصرف نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

ضعف بدن، افسردگی، سرگیجه، سردرد، واکنش های حساسیتی (راش پوستی، خارش پوست)، کرامپ و درد شکمی، یبوست، تهوع، هماچوری، افزایش آنزیم های کبدی، درد مفاصل، درد ماهیچه ها، آسیب و ضعف ماهیچه ها، بروشیت، سینوزیت، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، دیابت ملیتوس، ادم، التهاب پانکراس، غیر طبیعی شدن عملکرد تیروئید، زنیکوماسی، اختلالات شناختی (اختلال حافظه، فراموشی)، ترومبوسیتونی(کاهش تعداد پلاکت های خون)، اختلالات خواب.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- دارو را در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ی امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران- ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازرینی: مهر ۱۳۹۷



داروسازی خوارزمی
Kharazmi
pharmaceutical Co.

آدرس : تهران ، کیانوسر ۹ جاده مخصوص کرج ، شهرک استقلال
خیابان پاتل ، پلاک ۱۱۵ صندوق پستی : ۱۳۸۹۷۱۶۵۶۳
تلفن: ۰۲۱- ۴۴۵۴۲۱۳۰-۱۳۰-۴۴۵۴۲۱۳۰
info@kharazmiopharm.com - www.kharazmiopharm.com



داروسازی خوارزمی
Kharazmi
pharmaceutical Co.

آدرس : تهران ، کیانوسر ۹ جاده مخصوص کرج ، شهرک استقلال
خیابان پاتل ، پلاک ۱۱۵ صندوق پستی : ۱۳۸۹۷۱۶۵۶۳
تلفن: ۰۲۱- ۴۴۵۴۲۱۳۰-۱۳۰-۴۴۵۴۲۱۳۰
info@kharazmiopharm.com - www.kharazmiopharm.com

ATW.161/LF.0/P

ATW.161/LF.0/P