

قرص روكشدار خط دار
سيلركت® 100
سيلدنافيل

Scored F.C. tablet

Silerect® 100
Sildenafil

۲= هشدارها:

- اگر مدت زمان نعوظ طولانی شد (۹ ساعت یا بیشتر) فوراً به پزشک مراجعت نمایید.
- در صورت بروز کاهش بینایی فوراً پزشک را مطلع نمایید.

۳= موارد احتیاط:

- در صورت داشتن بیماری قلبی و عروقی یا پزشک معالج مشورت نمایید.
- استفاده هم‌زمان با سایر داروهای تأثیراتی جنسی توصیه نمی‌شود.

۴= تداخلات دارویی:

در صورت استفاده از سایر داروها مانند آفابیالکرها، بوستانت، داروهای ضد فشار خون، مهارکننده های آنتیزیم کبیدی سینوکروم P شامل سایمپتیدین، اریتروماسین، اینتراکوتازول، کتوکوتازول، سایکوبیناپر، سایر داروهای درمان عملکرد نعوظ، نیترات ها شامل نیتروگلیسرین، ریتوناپر و آنتاگونوستیت ویتامین k حتماً پزشک خود را مطلع سازید.

۵= عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موارد اثراز مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا دروساز خود مشورت نمایید:

عوارضی که در صورت وقوف بلاغافصله نیاز به توجه پزشک دارد:

مشکلات بینایی مانند تاری دید، تغییر قوه ادراک رنگها، حساسیت به نور، دویینی، افزایش فشار داخلي، قمزی و سوزش و تورم چشم، کاهش بینایی، گیجی، غفوتن، محاری ادراری، التهاب مثانه، مشاهده خون در ادرار، مشکلات عروقی، خونریزی، نعوظ طولایی مدت و مداوم، تنفس

عوارضی که در صورت تداوم و یا بدتر شدن نیاز به توجه پزشک دارد:

اسهال، سو، هاشمه، تنگی نفس، خون دماغ، ارتیما، برق و خونه شدن، سردرد، بی خوابی، درد عضلانی، اختناق بینی، تب، گاستریت، گرگ، سینوزیت، اضطراب.

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

۶= شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۸۵ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

ساخت شركت داروسازی خوارزمي، تهران- ايران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: اسفند ۱۴۰۸



آدرس: تهران، کلوفنتر ۹ جاده مخصوص کرج، شهرک استقلال
طبقه: طبقه ۱۱۵، کد پست: ۱۳۸۷۱۶۴۲۳، تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۶۵۴۰ - info@kharazmipharm.com - www.kharazmipharm.com

این دارو به صورت قرص های روکشدار خط دار حاوی ۱۰۰ میلی گرم ماده موثره سیلدنافیل (به صورت سیترات) توسط شرکت داروسازی خوارزمي تولید و در بسته بندی های ۴ عددی به همراه بروشور در بازار عرضه می شود.

۷= راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و با توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا دروساز اطلاع رسانی نمایید:

- وجود هر گونه حساسیت

- بارداری و پاشریه‌های

- استفاده از سایر داروها

- لایتلایه بیماری های دیگر

۸= موارد و مقدار مصرف دارو:

- فشار خون شریانی ریوی:

برگسالان: ۲۰ میلی گرم روزانه هر ۶-۸ ساعت. حداقل میزان مصرف توصیه شده: ۲۰ میلی گرم ۳ بار در روز است.

- اختلالات نعوظ در مردان:

برگسالان: شروع دوز مصرف ۵ میلی گرم می باشد که دوز دارو می تواند بر اساس ازبیختی درمانی و تحمل بیمار از ۷ چ و ۶۵۵۵ ۴ و گرم افزایش یابد. حداقل میزان مصرف روزانه ۶۵۵۵ میلی گرم می باشد.

افراد مسن: جهت رفع نقص عملکرد نعوظ: ۷ میلی گرم به فاصله یک ساعت قبل از فعالیت جنسی یکبار در روز: دوز دارو را بر اساس تحمل بیمار می توان افزایش داد.

۹= نحوه مصرف:

دارو به فاصله یک ساعت قبل از فعالیت جنسی مصرف شود.

شروع اثر دارو ۸۵ دقیقه بعد از خوردن آن آغاز می شود (در صورت مصرف به همراه غذا شروع اثر دیگر خواهد بود) و تا ۹ ساعت ادامه دارد و پس از ۷ ساعت عملکرد نعوظ کاهش می یابد.

۱۰= موارد منع مصرف:

- در مصارف اختلالات نعوظ، افت فشار خون سیستولی کمتر از ۵ mm Hg

- در بیمارانی با منع فعالیت جنسی و یا منع مصرف داروهای کشاد کننده عروق

- در بیماران با سایقه بیماری های تاریخی قلبی

۱۱= مصرف در بارداری و شیردهی:

- بارداری: مصرف این دارو تنها با تجویز پزشک توصیه می شود.

- شیردهی: مصرف این دارو تنها با تجویز پزشک توصیه می شود.

ATW.045/LF.0/P