

Scored F.C. Tablet

Sitagliptin

قرص روکشدار خط دار

سیتاگلیپتین

هر قرص روکشدار خط دار سیتاگلیپتین حاوی ۲۵ میلی گرم سیتاگلیپتین (به صورت مونوهیدرات) می باشد که در ۳ بلیستر ۱۰ عددی و در جعبه های ۳۰ عددی همراه با برگ راهنمای مصرف دارو عرضه می شود.

هر قرص روکشدار خط دار سیتاگلیپتین حاوی ۵۰ میلی گرم سیتاگلیپتین (به صورت مونوهیدرات) می باشد که در ۳ بلیستر ۱۰ عددی و در جعبه های ۳۰ عددی همراه با برگ راهنمای مصرف دارو عرضه می شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به مواراث اشوات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک قر دینده نمی شود آما در صورت بروز آن بای پوشک یا داروساز مشورت نماید.

التهاب بانکراس، درماتیت خفیف، آنزیسواد، سندروم استیونس-جانسون، نارسایی کلیوی، نارسایی فلئی، شوک آنافیلکسی، ادم محظی، کاهش قند خون، بیوست، راش پوستی، بالرقن ازبیم های کبدی، هورنت دستگاه تنفسی فوکالی، التهاب گلو، سرد، اسهال درد شکمی، تبعیع، استفراغ، تکبر، درد مفاصل، درد کمر، کاهش اشتتها، استیهای رگ های پوستی، خشکی هداخ، خواب آدگی، گیجی، اختلالات نوکا.

مسامویت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده و بروز مسمومیت سریعاً به پژش و بیمارستان مسمومین مراجعه کنید.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور و رطوبت در دمای کمتر از ۳۰ درجه ی سانتیگراد نگهداری نماید.

- هیچ فراورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نهیزید. در صورت نخوه ای احتماء آن را دکتر داروساز مشورت نماید. این اقدامات ممکن زیادی به حفاظت محظوظ زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران
تاریخ آخرین بازبینی و تدوین: اردیبهشت ۱۳۹۷

موارد منع مصرف:

دسته دارویی؛ ضد دیابت

درمان دیابت نوع ۱ و ۲ میلی گرم، یک بار در روز.

راهنمایی های عمومی:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تحولی شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و با توصیه آن به دیگران، خودداری نمایید.

هشدارها:

سیتاگلیپتین بهتر است در افراد زیر ۱۸ سال مصرف نشود.

در حین مصرف دارو از تغیینات الکل و فراورده های الکلی خودداری کنید.

اگر در حین مصرف دارو علائم پانکراتیت (درد شدید مدام شکمی) بروز کرد، دارو را قطع کرده و سریعاً به پژش مراجعت نمایید.

صرف این دارو ممکن است در بعضی از افراد باعث خسوب آنودگی و سرگیجه شود، لذا ضمن

درمان از رانندگی و کار با مانعین آلات دقیق، خودداری کنید.

احتیاط های مصرف:

سیتاگلیپتین در افراد زیر با اختیاط مصرف شود:

- در بیماران با دیابت نوع ۱ک و دیابت کوتاوسیدور

- در مصرف همزمان با اسپولین

- در سوختگی، بد، غفتگی، جراحی و ترموما

- در بیماران با انسداد سینه گاه تکاورش و اسپهال

- در بیماران با التهاب حاد بانکراس

- در بیماران با نارسایی، کبه و دیابتزی

- در بیماران با نارسایی و اختلال شدید عملکرد کبدی

- در بیماران مبتلا به درد مفاصل

تداخل های دارویی:

دیکوگلیپتین، کوربکاپتوپریدیها (باتامزاون، دگرامتسازون، بردنیزولون و ...)، سوماتروپین،

هیدروکلستروتازید، والرالان، کلاریتروماپسین، تیستوترون، آتانالاپر، آنولوپن، نیکوتینیک اسید (نیاسین)، نیمولاول، کاربیدولون، کدو-کنن، کلونیدین، سیپرو-فلوکسایسین، سیکلوسپورین، داسازول،

دیزوپریمید، تراپلیل سیپرولول، لاتالول، لووفولکاسین، لیزوزالاد، لیخسوم، رمنتوآس، اورازان،

متو-کلکسپوراید، متورولول، تراپلیل سیپرولول، ایزو-کربوکسازنید، موکسی فلوکسایسین، ناندرولون،

دیا-اسوا، اوکسیروتاتید، افولوکاسین، اکسی میوسن، بندوکسی فلیپس، بروپرولول، کائینوپرول،

لیزینوپرول، اتالاپرول، سوتاول، تاکرواپیموس، الکل، گلاریپک (سیپر)، چای سیز

نحوه صحیح مصرف دارو:

سیتاگلیپتین می تواند همراه با یادون غذای مصرف شود. جهت کاهش عوارض گوارشی، بهتر است

دارو بعد از غذا مصرف شود.



دروگسازی خوارزمی
Kharazmi
pharmaceutical Co.

آدرس: تهران - کلیوچت ۹ جاده مخصوص کرج - شهری استقلال
شندوق پستی: ۱۳۸۹۷۱۶۵۶۳
تلفن: ۰۲۱-۰۴۳۶۵۴۱۹-۰۷
info@kharazmipharm.com • www.kharazmipharm.com

ATW.051/LF.01/P