

E.C. Tablet

Pantoflex® 40
Pantoprazole

قرص انتریک کوند
پنتوفلکس ۴۰
پنتوپرازول

هر قرص پنتوفلکس[®] انتریک کوند حاوی ۴۰ میلی گرم پنتوپرازول است. که در ۳ بلیستر ۱۰ عددی و در جعبه های ۳۰ عددی، همراه با برگه راهنمای مصرف دارو عرضه می شود.

موارد و مقدار مصرف:

این دارو با کاهش ترشح اسید معده در درمان بیماری های زخم معده و دوازده، رفلاکس معده (برگشت اسید از معده به مری)، سندروم زولینگر-لیسون و در پروتکل درمان هلیکو باکتر پیلوری استفاده می شود.

دسته دارویی: مهارکننده ی پمپ پروتون

درمان رفلاکس معده به مری: ۲۰-۸۰ میلی گرم یک بار در روز برای ۴ هفته

برای پیشگیری از رفلاکس معده به مری: ۲۰ میلی گرم یک بار در روز

درمان بیماری زخم معده: ۴۰ میلی گرم یک بار در روز برای ۴-۸ هفته

درمان بیماری زخم دوازدهه: ۴۰ میلی گرم یک بار در روز برای ۴ هفته

پیشگیری از زخم ایجاد شده توسط داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی:

۲۰ میلی گرم یک بار در روز

راهنمای های عمومی:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران، جدا خودداری نمایید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

در صورت وجود هر گونه حساسیت نسبت به پنتوپرازول یا سایر اجزای فرمولاسیون یا پزشک خود مشورت نمایید.

مطالعات کافی در زمینه عوارض این فرآورده بر روی جنین در دوران بارداری انجام نشده است. در شیر ترشح می شود. لذا مصرف آن در طول دوران بارداری و شیردهی باید تحت نظر پزشک معالج انجام گیرد و فواید مصرف فرآورده در برابر مضرات آن سنجیده شود.

هشدارها:

قبل و در حین درمان طولانی مدت با پنتوپرازول، اندازه گیری سطح سرمی منیزیم پیشنهاد می شود. کاهش سطح سرمی منیزیم با علائمی مثل انقباض غیر ارادی ماهیچه ها، خستگی، تشنج، گیجی و بی نظمی ریتم قلب می شود.

مصرف طولانی مدت پنتوپرازول (بیش از سه سال) ممکن است منجر به کاهش جذب ویتامین B12 شود.

موارد احتیاط:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات زیر قبل از مصرف با پزشک خود مشورت کنید.

در افراد با نارسایی شدید کبدی، افراد مبتلا به یوکی استخوان و بیماری که

کورتیکواستروئید مصرف می کنند.

تداخل های دارویی:

سالیسیلات، متوتروکسات، پوسا کونازول، فلوکونازول، کتوکونازول، ایتراکونازول، وارفارین،

دیگوکسین، مایکوفنولات، آمپی سیلین، نمک های آهن، فلووکسامین، رفامپین، گیاه

Hypericum perforatum

نحوه صحیح مصرف:

قرص باید به طور کامل بلعیده شود، از شکستن و خرد کردن و جویدن آن بپرهیزید. قرص را میتوان به همراه غذا یا با فاصله از غذا مصرف نمود. بهترین زمان مصرف صبح ها قبل از صبحانه می باشد.

در افرادی که توانایی بلع ندارند، می توان قرص را فقط در آب سیب حل نمود و سی دقیقه قبل از غذا مصرف نمود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موزات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

درد شکمی، افزایش انزیم کبدی، اضطراب، درد مفاصل، خستگی و ضعف، درد کمر، التهاب برونش ها، درد قفسه سینه، گیجی، اسهال، یبوست، تهوع، استفراغ، سوزش سر دل، نفخ، کوتاه شدن تنفس، اختلالات گوارشی، میگرن و سردرد، افزایش قند خون، افزایش چربی خون، سفتی عضلات، بی خوابی، عفونت گوارشی و ادراری، تکرر ادرار، تغییر عملکرد کبدی، ادم، خشکی دهان، تغییرات وزن، راش پوستی

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک ویا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، در دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ی امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران- ایران
تاریخ آخرین بازرسی و تدوین: آبان ۱۳۹۶



داروسازی خوارزمی
Kharazmi
pharmaceutical Co.

آدرس: تهران، کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج، شهرک استقلال
خیابان پال، پلاک ۱۱
مندوق پستی: ۱۳۸۹۷۱۶۵۶۳
تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۵۳۱۳۰-۱۳۰
info@kharazmipharm.com - www.kharazmipharm.com

ATW.39/LF.0/P