

۷- موارد احتیاط:

- بیماران مبتلا به نارسای عملکرد کلیه و یا کبد قبل از مصرف این دارو پزشک معالج را مطلع نمایند.

- در صورت بوجود آمدن هرگونه عارضه جدید به هنگام استفاده از این دارو، پزشک معالج را آگاه سازید.

- از مصرف این دارو بیش از مقدار و مدت توصیه شده توسط پزشک خودداری کنید.

۸- تداخلات دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

سیتالوپرام، کلودیپوگرل، داساتینیب، متوتروکسات، تاکرولیموس.

۹- عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز هر یک از آن ها ضمن قطع مصرف دارو با پزشک مشورت شود: مشکلات پوستی، پف کردن پلکها، صورت و لبها، تب، سرفه، اشکال در بلع، گیجی، ضربان قلب سریع، درد مفاصل یا ماهیچه ها، کاهش اشتها، درد معده و پشت، تنگی نفس، زردی پوست و چشمها، ضعف و خستگی غیر معمول و استفراغ.

۱۰- شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران- ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: بهمن ۱۳۹۸

این دارو به شکل کپسول حاوی اس امپرازول (۲۰ میلی گرم) توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به همراه بروشور به بازار عرضه می شود.

۱. راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمایید:

* وجود هرگونه حساسیت * بارداری و یا شیردهی
* استفاده از سایر داروها * ابتلا به بیماری های

دیگر

* اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

۲- موارد و مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو بسته به شرایط بیماری و بیمار توسط پزشک معالج تجویز می گردد. اگرچه مقدار مصرف عمومی به شرح زیر است:

- در بیماری رفلاکس معده:

بزرگسالان: ۲۰ میلیگرم یک بار در روز به مدت ۴ تا ۸ هفته.

- در بیماری افزایش ترشح اسید معده:

بزرگسالان: ۴۰ میلی گرم دو بار در روز.

۳- نحوه مصرف:

- دارو را به همراه یک لیوان آب و حداقل یک ساعت قبل از غذا مصرف نمایید.

- در صورت فراموش کردن یک نوبت از دارو به محض به یاد آوردن، آن را مصرف نمایید، اما اگر زمان مصرف نوبت بعدی دارو رسیده باشد، از نوبت فراموش شده چشم پوشی کنید و مقدار مصرف نوبت بعدی را نیز دو برابر ننمایید.
- دوره درمان را طبق تجویز پزشک کامل نمایید.

۴- موارد منع مصرف:

- در صورت وجود حساسیت به اس امپرازول و یا هر یک از مواد تشکیل دهنده این فرآورده.

۵- مصرف در بارداری و شیردهی:

- مصرف این دارو در دوران بارداری تنها با تجویز پزشک معالج امکان پذیر می باشد. مصرف این فرآورده در دوران شیردهی ممنوعیت دارد.

۶- هشدارها:

- کپسول را بطور کامل بلعیده و از شکستن یا جویدن آن خودداری نمایید.

