


ORAL DROPS
ADSOL[®]
VITAMIN A+D



قطره خوراکی آدسول[®]

هر ۱ میلی لیتر (۲۵ قطره) از قطره ۱۵ میلی لیتری آدسول[®] حاوی ۱۵۰۰ واحد بین المللی ویتامین آ پالمیتات و ۴۰۰ واحد بین المللی ویتامین D۳ می باشد، که در جعبه های یک عددی همراه با قطره چکان عرضه می شود.

موارد مصرف:

کمک به تامین کمبود ویتامین آ+D
ویتامین A: رتینول در بینایی، رشد، تمایز بافت اپیتلیال و نیز نگهداری غشاهای مخاطی چشم، پوست، دهان، دستگاه گوارش و دستگاه ادراری ضروری است.
ویتامین D3: کوله کلسیفرول در کنترل جذب کلسیم رژیم غذایی از روده و باز جذب کلسیم از کلیه ضروری است.

مقدار مصرف:

مقدار مصرف هر فرآورده را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول این فرآورده به شرح ذیل است:
دوز پیشنهاد شده روزانه:
نوزادان از بدو تولد تا ۱۲ ماهگی: روزانه ۲۵ قطره و یا مطابق با نظر پزشک خود مصرف نمایید.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید:
در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به ویتامین ها یا هر یک از اجزای فرآورده با پزشک خود مشورت نمایید.
- در صورت ابتلا به سندرم سوء جذب و کاهش عملکرد کلیه در مورد مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت نمایید.
- در صورت هیپرویتامینوز (وجود مقادیر زیاد ویتامین A و D در بدن)، هیپرکلسمی (بالا بودن مقدار کلسیم در خون)، هیپرفسفاتمی (بالا بودن مقدار فسفات در خون).
مصرف در دوران بارداری و شیردهی:
این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی با احتیاط و زیر نظر پزشک معالج مصرف شود.

موارد احتیاط:

- در افراد با نارسایی مزمن کلیوی
- در افراد مصرف کننده الکل

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این فرآورده، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

اورلیستات (این فرآورده دو ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از مصرف اورلیستات مصرف شود)، آریپیپرازول، نمک های کلسیم، دیگوکسین، دانازول، سوکرافیت، هیدروکلروتیازید.

نحوه صحیح مصرف فرآورده:

این فرآورده را همراه با غذا و یک لیوان پر از آب مصرف نمایید.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده و بروز علائم زیر سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

علائم هیپرکلسمی: سردرد، تهوع، استفراغ، گیجی، درد شکمی، درد استخوان، پلی اوری (زیاد شدن ادرار)، ضعف، آریتمی قلبی، رسوب کلسیم در بافت های نرم، کلسی اوری (دفع کلسیم از ادرار).

شرایط نگهداری:

فرآورده را در محل خشک و خنک در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

- فرآورده را در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید.

- فرآورده را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ی امحاء آن با دکتر داروساز مشورت

نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست

می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران- ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: دی ۱۴۰۰



ATW.026/LF.0

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا جلال
پن سمت داروسازی خوارزمی، پلاک ۱۱۵
کدپستی: ۱۳۸۹۷۱۵۱۲
تلفن: ۲۲۵۵۲۱۴-۱۷
info@kharazmipharm.com www.kharazmipharm.com

شرکت داروسازی
خوارزمی