

ولوتیل® ۵۰۰، قرص خوراکی خط دار حاوی ۵۰۰ میلی گرم از ماده موثره استامینوفن می باشد. قرص های ولوتیل® ۵۰۰ در پلیسترهای ۱۰ عددی، به همراه پرورشور داخل جعبه، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه میشود.

۱- راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمایید:

- وجود هر گونه حساسیت

- ابتلا به بیماری های دیگر

- اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

۲- موارد و مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف قرص استامینوفن ۵۰۰ بسته به شرایط بیماری و بیمار توسط پزشک معالج تجویز می گردد. این دارو ممکن و تب بر است که جهت درمان تب، سردرد، دردهای خفیف، کمر درد، دردهای قاعدگی، دردهای عضلانی و درد دندان تجویز می گردد.

مقدار مصرف عمومی:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

حداکثر دوز مصرف دارو ۸ عدد قرص استامینوفن ۵۰۰ میلی گرم (۴ گرم) برای بزرگسالان است.

بیماران نباید این دارو را با سایر فرآورده های حاوی استامینوفن مصرف نمایند.

بزرگسالان و کودکان بالاتر از ۱۲ سال:

به عنوان ضد درد و تب بر روزانه یک عدد قرص هر ۴ تا ۶ ساعت.

کودکان تا سن ۱۲ سال:

مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین شود.

۳- نحوه مصرف:

- دارو را همراه با غذا یا یک لیوان آب میل نمایید.

- چنانچه یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید به محض به یاد آوردن، آن را مصرف نمایید. ولی اگر به نوبت بعدی نزدیک بود از مصرف آن خودداری نمایید و از دو برابر کردن مصرف بعدی برای جبران نوبت فراموش شده خودداری کنید و به صورت معمول نوبت بعدی را سر وعده مصرف کنید.

۴- موارد منع مصرف:

در صورت سابقه حساسیت به استامینوفن و یا سایر ترکیبات موجود در قرص.

۵- مصرف در بارداری و شیردهی:

استامینوفن از جفت عبور کرده و از لحاظ خطرات مصرف در دوران بارداری در دسته B (بی خطر) قرار می گیرد. به طور معمول در تمام دوران بارداری مصرف می شود. مصرف دارو در دوزهای درمانی در دوران بارداری صدماتی به جنین وارد نمیکند. مصرف دوزهای بالا به صورت مداوم ممکن است در مادر ایجاد کم خونی کند و جنین نیز با مشکلات کلیوی روبرو می شود.

مصرف در شیردهی استامینوفن به مقدار خیلی کم در شیر ترشح می شود. عوارض جانبی در نوزادان شیر خوار مشاهده نشده است.

۶- هشدارها:

۱- از مصرف بیش از اندازه مجاز خودداری شود.

۲- در افرادی که به میزان زیاد الککل مصرف می نمایند مقدار مصرف نباید بیشتر از: ۴ قرص (۲ گرم) در روز باشد.

۳- در صورت ابتلا به بیماری های کلیوی، هپاتیت و سایر بیماری های کبدی و فنیل کتونوری در مورد مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

۴- از مصرف همزمان این فرآورده با سایر داروهای حاوی استامینوفن خودداری کنید و در مورد مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

۵- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار مجاز به اولین مراکز درمانی مراجعه کنید.

۷- موارد احتیاط:

- در بیماران با سابقه سوء مصرف الککل مصرف نشود.

- در بیماران با مشکلات کبدی با دستور پزشک مصرف شود.

- چنانچه بیش از دو روز دارای گلو درد هستید که همراه تب، سردرد، تهوع و راش پوستی است از مصرف دارو خودداری کرده و به پزشک مراجعه کنید.

۸- تداخلات دارویی:

- قبل از شروع درمان پزشک خود را در صورت مصرف داروهای ذیل مطلع سازید:

مصرف استامینوفن همراه با رابیتورات ها، زغال فعال، الککل، فنیل کتونین، ایزونیاژید، لاموتوزین، وارفارین و سولفین پیرازول، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (خصوصاً اسپیرین) توصیه نمی شود.

۹- عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

با مصرف دوزهای بالای استامینوفن مواردی از گچی، سردرگمی و هیجانات زیاد دیده شده است. گزارشاتی مبنی بر نوتروپنی، پان سیستونی (Pancytopenia) و ترومبوسیتوپنی (thrombocytopenia) با مصرف استامینوفن موجود است.

به مقدار کم ازمی های کبدی را بالا برده و در مصرف بیش از حد مشکلات کبدی دیده شده است. راش پوستی و آسیب های کلیوی ممکن است با مصرف استامینوفن مشاهده شود.

۱۰- شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- دارو را در بسته بندی اصلی خود و دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: مهر ۱۳۹۸



داروسازی خوارزمی
Kharazmi
pharmaceutical Co.

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا جلال،
پنجمین دروازه خوارزمی پلاک ۱۵
تلفن: ۰۲۱-۳۳۵۵۳۱۳۰، ۰۲۱-۳۳۵۵۳۱۳۱
کدپستی: ۱۳۸۹۷۱۵۱۲
info@kharazmipharm.com • www.kharazmipharm.com