

فنیل کتونوری در مورد مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

- از مصرف همزمان این قرآورده با سایر داروهای حاوی استامینوفن و یا کدئین خودداری کرده و در مورد مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

- دربروز واکنش های آلرژیک(رتنس دشوار، درد شدید شکمی، قرمزی و خارش پوست)، دارو را قطع کرده و سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.

- از مصرف همزمان با سایر خواب آورها و نیز سرکوب کنندگان سیستم تنفسی خودداری گردد.

- مصرف این قرآورده میتواند باعث خواب آلودگی گردد لذا از رانندگی و یا کار کردن با ماشین الاتی که نیاز به هوشیاری کامل دارند پرهیز نمایید.

موارد احتیاط:

در صورت ابتلا به هر یک از حالات ذیل قبل از مصرف دارو پزشک معالج خود را مطلع نمایید:

- در صورتی که بعد از چند روز، بهبودی در درد شما حاصل نشد به پزشک خود اطلاع دهید.

- اختلال عملکرد کبدی: بیماریانی که دچار آسیب کبدی هستند یا از داروهای القا کننده آنزیم های کبدی استفاده مینمایند، میبایست در مصرف این قرآورده احتیاط کنند، زیرا این دارو باعث افزایش خفیف آنزیم های کبدی می شود.

- در سابقه کاهش فشار خون

- در احتیاط اسرار و مزاجی (یبوست شدید)

- در افراد با سابقه سوء مصرف مواد مخدر، توهم یا سایر مشکلات ذهنی شدید

تداخلات دارویی:

- قبل از شروع درمان پزشک خود را در صورت مصرف داروهای ذیل مطلع سازید:

داروهای درمان صرع (مانند فنوباریتال)، سایر ضد درد های اویپوئید (اکسی کدون، ترامادول، متادون)، بنزودیازپین ها (دiazepam)، کلونازپام، آلپرازولام، دوکسوروبیسین، مهار کننده های مونو آمینو اکسیداز (ترانزیل سیرومین، ایزوکربوکسازید، فنلژین)، ضد داروهای ضد سایکوز (هالوپریدول، هالوپریدول، تری فلوپرازین)، ضداسفردگی های سرتونینی (سرتالین، فلوکستین، پاروکستین)، متوکاربامول، تیزانیدین، باکلوپن، متوکلوپرامید، دارو های ضد التهاب غیر استروئیدی (خصوصاً اسپیرین)، آنتی هیستامین ها، دوپرمیدون، کلسترئامین، وارفارین، هپارین و سایر کو مارین ها.

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

خواب آلودگی، احساس سبکی سر، گیجی، سرگیجه، کوتاه شدن تنفس، تهوع، استفراغ، کاهش اشتها، ضعف ماهیچه ها، اختلالات نعوظ، واکنش های آلرژیک، احساس سرخوشی و رضایت، یبوست، درد شکمی، کپهر، راش پوستی، ترومبوسیتونی، خشکی دهان، آگرانولوسیتوز (کاهش تعداد گرانولوسیت های خون)، بی خوابی، بی قراری، عصبی شدن، تشنج، توهم، سمیت کبدی، اختلال کلیوی.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- دارو را در بسته بندی اصلی خود و دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

قرص خط دار استامینوفن کدئین، حاوی ۳۰۰ میلی گرم استامینوفن و ۲۰ میلی گرم کدئین فسفات می باشد که چپه به همراه برشور، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه میشود.

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمایید:

* وجود هر گونه حساسیت * بارداری و یا شیردهی

* استفاده از سایر داروها * ابتلا به بیماری های دیگر

* اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

موارد و مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

- کاهش درد خفیف تا متوسط در سردد، میگرن، درد قاعدگی، درد کمر و عضلات، گلودرد و درد دندان.

بزرگسالان و کودکان بالای ۱۲ سال: یک الی دو قرص هر ۴-۶ ساعت، ماکسیمم تعداد قرص در هر ۲۴ ساعت ۸ عدد میباشد.

- کنترل علایم آنفولانزا.

بزرگسالان و افراد بالای ۱۸ سال: یک الی دو قرص هر ۴-۶ ساعت، ماکسیمم تعداد قرص در هر ۲۴ ساعت ۱۲ عدد میباشد

نحوه مصرف:

- دارو را همراه با یک لیوان آب میل نمایید.

- در صورت فراموشی یک دوز از دارو به محض به یاد آوردن، آن را مصرف نمایید. ولی اگر به نوبت بعدی نزدیک بود از مصرف آن خودداری نمائید و از در برابر کردن مصرف بعدی برای جبران نوبت فراموش شده خودداری کنید و به صورت معمول نوبت بعدی را سر وعده مصرف کنید

موارد منع مصرف:

- در صورت سابقه حساسیت به هر یک از ترکیبات موجود در قرص.

- در کودکان زیر ۱۲ سال.

- در انسداد دستگاه گوارش

- در مشکلات آسمی و یا سرکوب حاد دستگاه تنفس.

- در کودکان زیر ۱۸ سال که جهت درمان آپنه تنفسی انسدادی هنگام خواب، تحت جراحی حذف لوزه بوده اند.

- در الکلیسم شدید، نارسایی شدید کبد و کلیه، در ریسک تشنج.

- در بیماریانی که کدئین در بدن آن ها بصورت فوق سریع متابولیزه می شود.

- در بیماران قلبی

- در اسهال ناشی از کولیت غشای کاذب و یا مسمومیت.

- در افراد زیر ۱۸ سال که عملکرد سیستم تنفسی تضعیف شده دارند.

- در افراد زیر ۱۸ سال جهت درمان علامتی سرفه و آنفولانزا.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود.

هشدارها:

- هنگام استفاده از این دارو از مصرف مشروبات الکلی خودداری نمایید زیرا باعث افزایش عوارض جانبی استامینوفن می گردد.

- در ابتلا به بیماری های کلیوی، هپاتیت و سایر بیماری های کبدی و



داروسازی خوارزمی

Kharazmi

pharmaceutical Co.

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا جلال،
پن بیست داروسازی خوارزمی، پلاک ۱۱۵
تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۴۱۳۱۷ * کدپستی: ۱۳۹۷۱۵۵۱۲
info@kharazmipharm.com - www.kharazmipharm.com