قرص خط دار

سرماخوردگی بزرگسالان

این دارو به شکل قرص خوراکی خط دار، حاوی استامینوفن (۳۲۵ میلی گرم) و فنیل افرین هیدروکلراید (۵ میلی گرم) و کلرفنیرامین مالئات (۲ میلی گرم) می باشد که توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید، و در جعبه های ۱۰۰عددی (۱۰ بلیستر ۱۰ عددی) و ۳۰ عددی (۳ بلیستر ۱۰ عددی) به همراه متن راهنمای محصول به بازار عرضه می شود.

راهنمای عمومی :

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمایید:

– وجود هر گونه حساسیت – بارداری و یا شیردهی

– استفاده از سایر داروها – ابتلا به بیماری های دیگر

موارد و مقدار مصرف دارو :

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

دوز معمول داروهای سرماخوردگی برای بزرگسالان هر ۸ ساعت یک قرص است.

نحوه مصرف:

– دارو را راس ساعت به همراه یک لیوان آب میل نمایید .

موارد منع مصرف:

– تداخل دارویی سرماخوردگی را چک کنید و اگر در حال استفاده از داروبی هستید. که با این دارو تداخل دارد، با پزشک خود راجع به استفاده از داروهایتان مشورت نمایید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

در دوران بارداری و شیردهی، نباید دارویی بدون مشورت با پزشک استفاده کنید. داروها میتوانند آثار مخربی روی جنین و یا خودتان داشته باشند. داروهای سرماخوردگی برای استفاده در دوران بارداری مناسب نیستند.

هشدارها:

در صورت ابتلا به هرنوع بیماری مثل مشکلات تنفسی، آسم، دیابت، بزرگی پروستات، بیماریهای قلبی، فشار خون بالا و بیماری تیروئید در صورت داشتن آسم، بیماری انسداد مزمن ریوی(COPD) ، برونشیت مزمن، آمفیزم، مشکلات ریوی، نفس نفس زدن، وقفه تنفسی در خواب (آپنه) پزشک معالج را مطلع نمایید.

موارد احتیاط :

– مصرف این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی شود، لذا ضمن درمان با این دارو از رانندگی و یا کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری کامل دارد خودداری نمایید.

Scored Tablet

Adult cold

–در صورت داشتن انسداد معده، روده، مجاری ادرار، مشکل دفع ادرار، دیابت، زخم معده، بزرگی پروستات، گلوکوم یا ازدیاد فشار در چشم، بیماریهای قلبی، فشار خون بالا، پورفیری و بیماریهای تیروئید، پزشک معالج را مطلع نمایید.

– محصولات سرماخوردگی ممکن است با تستهای آزمایشگاهی خاص تداخل کند و احتمالاً باعث نتایج اشتباه شود. قبل از انجام آزمایش آزمایشگاه را در خصوص مصرف این دارو مطلع سازید.

تداخلات دارویی:

– آنتی هیستامینهای موضعی (مانند کرم، پماد، اسپری دیفن هیدرامین)، الکل، آنتی هیستامینها (از قبیل، دیفن هیدرامین ، داروهای خواب و یا اضطراب (مانند آلپرازولام دیازپام ، زولپیدم) شل کننده‌های عضلانی و داروهای ضد درد و مسکن.

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز هر یک از آن ها با پزشک خود مشورت نمایید.

سرگیجه، خواب آلودگی، سردرد، تاری دید ، ناراحتی معده ، حالت تهوع ، یبوست، خشکی دهان و بینی و گلو

در صورت بروز نوع شدید هریک از عوارض جانبی و یا استمرار آن، حتماً با پزشک مربوطه مشورت نمایید خصوصاً در موارد زیر:

واکنشهای آلرژیک شدید (سرخی پوست و دانه های پوستی، کهیر، تنفس سخت، احساس تنگی نفس و سنگینی در قفسه سینه، متورم شدن دهان، صورت، لبها و یا زبان)، تشنج، تپش سریع قلب، کاهش هوشیاری، هذیان گویی، رعشه، خس خس یا خر خر

شرایط نگهداری:

– دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد ، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

– دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران– ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: مرداد ۱۴۰۴

شرکت داروسازی خوارزمی

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا جلال، بن بست داروسازی خوارزمی، پلاک ۱۱۵

کدپستی: ۱۳۸۹۷۱۶۵۱۲ تلفن: ۱۷-۴۴۵۴۵۴۱۳-۰۲۱

info@kharazmipharm.com www.kharazmipharm.com

ATW.044/LF/01