

# Aspirin 81

(Acetylsalicylic Acid)

# آسپرین ۸۱

(استیل سالیسیلیک اسید)

قرص اتریک کوئد آسپرین ۸۱ حاوی ۸۱ میلی گرم استیل سالیسیلیک اسید می باشد که در پلیسترهای بیست عددی و در جعبه های ۱۰۰ عددی همراه با برگه راهنمای مصرف دارو عرضه می شود.

**موارد و مقدار مصرف:**

**دسته دارویی:**

**ضد پلاکت**

**بعد از سکنه حاد قلبی مشکوک:**

بلافاصله بعد از حمله مشکوک قلبی، ۱۶۲ میلی گرم (۲ عدد قرص) مصرف نمایند و تا ۳۰ روز ادامه دهید.

**پیشگیری از حمله قلبی در افراد با ریسک بالا:**

۸۱-۲۲۵ میلی گرم یک بار در روز.

**در افراد با سابقه سکته قلبی گذشته یا آتروین ناپایدار:**

۸۱-۲۲۵ میلی گرم یک بار در روز.

**پس از حمله گذرای ایسکمیک مغز و پیشگیری ثانویه از سکته مغزی ترومبونیک:**

۸۱-۲۲۵ میلی گرم، یک بار در روز.

**پیشگیری از ترومبوز ورید عمقی بعد از عمل جراحی تعویض مفصل ران:**

۱۶۲-۲۲۵ میلی گرم، یک بار در روز.

**راهنمایی های عمومی:**

- این دارو برای بیماری قلبی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران، جدا خودداری نمایید.

- در صورت بروز علائم حمله قلبی (احساس سنگینی در قفسه سینه، درد در قسمت مرکزی قفسه سینه که بیش از چند دقیقه طول بکشد و یا سریعاً از بین رفته و مجدداً ظاهر شود، دردی که به شانه و گردن و بازو انتشار پیدا کند) سریعاً به اورژانس مراجعه نمایید.

- در طول درمان با آسپ. از مصرف الکل و فرآورده های الکلی خودداری کنید.

**موارد منع مصرف:**

- در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید: در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به آسپ. یا سایر NSAIDs (داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی) یا هر یک از اجزای دارو یا پزشک خود مشورت نمایید. در صورت ابتلا به اختلالات خونریزی دهنده، خونریزی فعال گوارشی، کودکان زیر ۱۲ سال و نوجوانان مبتلا به عفونت های ویروسی (انفلوانزا و ابله مرغان) یا تب (به دلیل ریسک سندرم ری، ایمپران هوفبلی، اختلال شدید کبدی در مورد مصرف این دارو یا پزشک خود مشورت نمایید.

**مصرف در دوران بارداری و شیردهی:**

این دارو در دوران بارداری و شیردهی به خصوص به دلیل ریسک خونریزی و تأخیر زمان زایمان با احتیاط و فقط زیر نظر پزشک مصرف شود. این دارو در دوران شیردهی در دوزهای بالا به علت ریسک سندرم ری و کاهش ذخایر ویتامین K و ریسک خونریزی در جنین بهتر است مصرف نشود.

**هشدارها:**

- از مصرف همزمان این دارو با سایر فرآورده های حاوی آسپ. و سایر NSAIDs (ایبوپروفن، ناپروکسن، دیکلوفناک و...) بپرهیزید. زیرا سایر NSAIDs اثر حفاظت قلبی آسپ. را کم می کند. بنابراین NSAIDs یک ساعت قبل تا یازده ساعت بعد از دوز روزانه آسپ. مصرف شود.

- در صورت تریب و واکنش های سرخ، سرخچه و ویراسلا زوستر، آسپ. قطع شده و ۶ هفته بعد تحت نظر پزشک دوباره مصرف شود.

- آسپ. باید یک هفته قبل از عمل جراحی قطع شود. این دارو باعث گیجی می شود، لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.

**موارد احتیاط:**

آسپ. در موارد زیر با احتیاط و زیر نظر پزشک مصرف شود:

- در بیماری های آلرژیک، اسهال، آنمی، کمبود آهن، کمبود گلبولهای قرمز، کمبود پلاکت، کمبود ویتامین K، کمبود تیروئیدی، فشارخون بالا کنترل نشده.

- آسپ. و سایر سالیسیلات ها در تست های عملکرد تیروئید تغییر ایجاد می کند.

**تداخل های دارویی:**

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

دی پیریدامول، تیکلوپیدین، استازولامید، پروپرانولول، متوپرولول، اتنولول، آموکسی سیلین، آمپی سیلین، گلی بنکلامید، سیپروفلوکساسین، آمینوگلیکوزید (جنتامایسین)، دیگوکسین، کاپتوپریل، الازاپریل، اسپرونولاکتون، لوزارتان، وازارتان، انوکسازیرن، هپارین، رپروگاسبان، کوکرتیکواستروئید، انسولین، گلوکاگون، مونوژوکسات فنی توئین، واپروات، فوروزماید، وراپامیل، فلوکستین، فلوکسامین، دولوکستین، سیتالوپرام، سرتالین، واکسن آنفلوانزا.

**نحوه صحیح مصرف دارو:**

برای کاهش عوارض گوارشی، بهتر است دارو بعد از غذا مصرف شود.

**عوارض جانبی:**

هر دارو به موثرات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک خود مشورت نمایید.

درد شکمی، اختلالات خونریزی دهنده، اسهال، سوزش سر دل، یبوست، زخم دودئال، نفخ، زخم گوارشی، التهاب دستگاه گوارش، سردرد، لوکوپنی (کاهش تعداد لکوسیت ها)، تهوع، گزگز اعضای بدن، خارش، راش پوستی، تهوع، سرگیجه، گیجی، التهاب پانکراس، اختلال شنوایی، سندرم استیوینسون جانسون، تب، توهم، التهاب گولومرول کلیه، پنومونی.

**مسمومیت:**

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده و بروز علائم مسمومیت، دارو را قطع کرده و سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

**علائم مسمومیت خفیف:** احساس سوزشگی در دهان، تهوع، استفراغ، وزوز گوش، تعریق، احساس تشنگی، تپکی کاردی (افزایش ضربان قلب)، سرگیجه.

**علائم مسمومیت در حد متوسط:** علاوه بر علائم بالا، تپکی بته (افزایش تعداد تنفس)، افزایش غیر عادی دمای بدن، تعریق، کم شدن وزن بدن، کاهش هماهنگی اعضای بدن، بی قراری، گیجی.

**علائم مسمومیت شدید:** علاوه بر علائم بالا، کاهش فشار خون، توهم، کاهش سطح هوشیاری، کاهش قند خون، تشنگی، ادم مغزی، کم شدن ادرار، نارسایی کلیوی، نارسایی قلبی، خونریزی، اسیدوز متابولیک، الکالوز یا نارسایی تنفسی و کما.

**شرایط نگهداری:**

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- دارو را در دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- هیچ فرآورده ای دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ای امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

**ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران- ایران**

**تاریخ آخرین بازرینی و تدوین: خرداد ۱۳۹۷**

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا جلال،  
پلاک ۱۱۵  
پست بستی داروسازی خوارزمی،  
کدپستی: ۱۲۸۷۱۵۲۱ تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۵۲۱۳۱  
www.kharazmi-pharm.com info@kharazmi-pharm.com

شرکت داروسازی  
**خوارزمی**