

الگزیر بلتیل® برم هگزین

هر پیمانه (۵ میلی لیتر) از الگزیر ۶۰ میلی لیتری بلتیل® حاوی ۴ میلی گرم برم هگزین هیدروکلراید می باشد، که در جعبه های یک عددی همراه با پیمانه و برگه راهنمای مصرف در عرصه می شود.

موارد و مقدار مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:
دسته دارویی: ضد سرفه (خلط آور)

ضد سرفه و خلط آور:

کودکان ۵-۲ سال: ۲/۵ میلی لیتر، ۳ بار در روز.

کودکان ۱۲-۶ سال: ۵ میلی لیتر، ۳ بار در روز.

بزرگسالان و کودکان بالای ۱۲ سال: ۱۰ میلی لیتر، ۳ بار در روز.

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی و سرگیجه شود، لذا در هنگام مصرف، از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری نمایید.

از دوز توصیه شده تجاوز نکنید و مصرف طولانی مدت حتماً با دستور پزشک انجام شود.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده یا پزشک خود مشورت نمایید:

در صورت وجود هر گونه حساسیت نسبت به برم هگزین یا هر یک از اجزای دارو یا پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری به ویژه ماه های اول بارداری و همچنین دوران شیردهی، می بایست با نظر پزشک متخصص صورت گیرد.

هشدارها:

-از تنفس برم هگزین خودداری نمایید. این عمل موجب سرفه و یا برونکواسپاسم در شرایط خاص می شود.
-هنگام مصرف این دارو، از نوشیدن فرآورده های حاوی الکل خودداری نمایید.

موارد احتیاط:

برم هگزین در افراد زیر با احتیاط مصرف شود:

-در افراد با سابقه ی زخم های گوارشی

-در بیماران مبتلا به آسم

-در افراد مبتلا به اختلالات کبدی و کلیوی

تداخلات دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

مترونیدازول، فلوزاویدین و نیتروفورانتوئین.

نحوه صحیح مصرف دارو:

-برای جلوگیری از بروز عوارض گوارشی، بهتر است دارو پس از غذا مصرف شود.

-بهتر است الگزیر دارو ابتدا با آب رقیق شده و سپس مصرف شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

گیجی، سردرد، افزایش تعریق، راش پوستی،

خواب آلودگی، خستگی و اختلالات گوارشی.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

-دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

-دارو را در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید.

-دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- هیچ فرآورده ی دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ی امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران- ایران
تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: خرداد ۱۴۰۲