

قرص روکشدار
بیسمونول[®] ۱۲۰
بیسموت ساب سترات

معهده خالی نیم ساعت قبل از هر سه وعده غذایی اصلی و قبل از خواب. یا ۲ قرص دو بار در روز، نیم ساعت قبل از صبحانه و نیم ساعت قبل از شام یا قبل از خواب.

دوره درمان معمول دارو ۴ تا ۸ هفته برحسب تجویز پزشک می باشد. در صورت نیاز به ادامه درمان، بعد از یک دوره قطع دارو (به مدت یک ماه) مجدداً توسط پزشک تجویز خواهد شد.

نحوہ مصر ف:

–قرص را به طور کامل ببلعید و از جویدن آن ها خودداری کنید به همراه یک لیوان آب میل نمایید .

چنانچه یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید به محض به یاد آوردن، آن را مصرف نمایید. ولی اگر به نوبت بعدی نزدیک بود از مصرف آن خودداری نمایید و از دو برابر کردن مصرف بعدی برای جبران نوبت فراموش شده خودداری کنید و به صورت معمول نوبت بعدی را سر وعده مصرف کنید.

-در صورتی که احساس می کنید که اثرات دارو خیلی شدید یا بیش از حد ضعیف است با پزشک معالج خود یا دکتر داروساز تماس بگیرید.

موارد منع مصرف:

۱- در صورت سابقه حساسیت به بیسموت و یا سایر ترکیبات موجود در قرص.

۲- از مصرف همزمان این دارو با داروهای حاوی بیسموت خودداری نمایید.

۳- مصرف این دارو در افراد با اختلالات شدید عملکرد کبدی، کلیوی و بیماری‌های سیستم عصبی، تنگی مجرای پیلور، برداشتن بخشی از معده، شواهد بالینی و یا سابقه خونریزی گوارشی، توصیه نمی‌شود.

۴- هنگام مصرف این دارو از مصرف شیر، غذا یا آنتی اسید به مدت ۳۰ دقیقه قبل و بعد از خوردن دارو خودداری نمایید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

بیسمونول[®] ۱۲۰، قرص های خوراکی هستند که حاوی بیسموت ساب سیترات معادل ۱۲۰ میلی گرم بیسموت اکساید می باشند. بیسموت ساب سیترات ۱۲۰ در جعبه ۳۰ عددی (۳ پلیستر ۱۰ عددی)، به همراه بروشور داخل جعبه، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می شود.

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمایید:

- وجود هر گونه حساسیت - یارداری و یا شیردهی

- استفاده از سایر داروها

-اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

موارد و مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف قرص پیسموت ساب سترات ۱۲۰ بسته به شرایط بیماری و بیمار توسط پزشک معالج تجویز می گردد. جهت درمان زخم عمده و روده و نیز اسهال مســـــــــــــــــــــافرتی و درمان عفونت گوارشی ناشی از هلیکوباکتر پیلوری همراه با سایر دارو ها (مترونیدازول، آموکسی سیلین ...) تجویز می گردد.

مقدار مصرف عمومی:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

درمان عفونت گوارشی ناشی از هلیکوباکتر پیلوری:

به همراه سایر داروهای ضد باکتری و ضد ترشح اسید معده، ۱ قرص ۴ بار در روز برای ۱۴ روز مصرف شود.

زخم خوش خیم معده و اثنی عشر:

بزرگسالان و سالمندان: ۴ قرص، روزانه به صورت ۱ قرص چهار بار در روز یا

اگر به بارداری فکر می کنید یا در حال برنامه ریزی برای داشتن یک کودک می باشید، قبل از مصرف هر گونه دارو، با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

از مصرف این دارو در دوران بارداری و یا شیردهی خودداری نمایید.

هشدارها:

- حداکثر مدت یک دوره درمان دو ماه است. از مصرف سایر محصولات حاوی بیسموت برای مدتی طولانی استفاده ننماید. همچنین بعد از مصرف دارو تا ۲ ماه بعد از مصرف داروهای حاوی بیسموت خودداری نماید.

- برای درمان زخم های دهان و دندان یا معده، مدت یک دوره درمان ۴ تا ۸ هفته می باشد.

- مصرف این دارو به کودکان و افراد کمتر از ۱۴ سال توصیه نمی شود.

موارد احتیاط:

- در صورت وجود اسهال بیش از ۲ روز همراه با تب از مصرف دارو خودداری نمایید.

- این دارو به عنوان یک داروی کمکی به همراه داروهای دیگر در درمان زخم دستگاه گوارش استفاده می شود.

- در سالخوردگان و افرادی که نارسایی خفیف کلیوی دارند با احتیاط مصرف شود.

- جهت انجام معاینات دوره ای به طور منظم به پزشک مراجعه نمایید.

تداخلات دارویی:

۱- از مصرف همزمان این دارو با ترکیبات حاوی بیسموت خودداری نماید.

۲- این دارو ممکن است اثر آنتی بیوتیک ها و تتراسایکلین ها را در صورت استفاده همزمان کاهش دهد.

۳- مصرف همزمان با امپرازول و رانیتیدین ممکن است باعث افزایش میزان جذب بیسموت شود که ممکن است ریسک سمیت بیسموت را افزایش دهد.

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید. به دلیل جذب کم بیسموت عوارض زیادی برای این دارو گزارش نشده است مگر در مصرف طولانی مدت دارو یا دوز بالا که ممکن است سبب عوارض مسمومیت با دارو گردد. از مصرف طولانی مدت دارو خودداری نمایید.

- عوارض جانبی شایعی که در صورت تداوم نیاز به توجه پزشکی دارند: سیاه شدن مدفوع (به مرور زمان از بین می رود)

- عوارض جانبی با احتمال وقوع بسیار کم که نیاز به توجه پزشکی دارند: تهوع، استفراغ، یبوست یا اسهال، بثورات، واکنش ها آلرژیک مانند خارش، راش پوستی در موارد خیلی نادر شوک آنافیلاکتیک گزارش شده است.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- دارو را در بسته بندی اصلی خود و دور از دسترس کودکان نگهداری نماید.

- هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ای امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: مهر ۱۴۰۳