قرص روکشدار

بیزوپرولول/ آملودیپین

هرعدد قرص خوراکی روکشدار حاوی بیزوپرولول فومارات و آملودیپین بزیلات به عنوان ماده موثره دارویی میباشد که در مقادیر ترکیبی ذیل توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می شود:

قرص روکشدار بیزوپرولول ۵ میلی گرم + آملودیپین ۵ میلی گرم

قرص روکشدار بیزوپرولول ۵ میلی گرم + آملودیپین ۱۰ میلی گرم

قرص روکشدار بیزوپرولول ۱۰ میلی گرم + آملودیپین ۵ میلی گرم

قرص روکشدار خط دار بیزوپرولول ۱۰ میلی گرم + آملودیپین ۱۰ میلی گرم

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمایید :

* وجود هر گونه حساسیت
* بارداری و یا شیردهی
* استفاده از سایر داروها
* ابتلا به بیماری های دیگر

موارد مصرف دارو :

درمان فشارخون بالا در بیمارانی که به طور مناسب با هر یک از اجزاء این فراورده به طور جداگانه بیماری خود را تحت کنترل دارند.

نحوه مصرف:

مقدار متداول مصرف این دارو روزانه یک قرص صبح ها همراه یا بدون غذا و با مقدار کمی مایعات است. قرص را کامل ببلعید.

موارد منع مصرف:

از خوردن این فراورده در صورت وجود هریک از موارد زیر اجتناب کنید:

به هریک از اجزاء فراورده حساسیت دارید .

دچار نارسایی قلبی مزمن هستید.

دچار شوک مرتبط با عملکرد نامناسب قلبی هستید.

دچار بیماری قلبی که مربوط به ضربان بسیار کند و یا انقباضات نامنظم قلبی هستید .

دارای فشارخون بسیار پایین هستید.

دچار آسم یا مشکلات انسدادی مجاری تنفسی هستید.

دچار بیماریهای مرتبط با عروق محیطی هستید.

مبتلا به سندرم رینود هستید.

مبتلا به فئوکروماسیتوما (Adrenal gland) هستید.

در شرایط متابولیکی که PH خون به سمت اسیدی شدن می رود.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این فراورده در دوران بارداری تنها با تجویز و صلاحدید پزشک معالج امکان پذیر است.

مصرف این فراورده در دوران شیردهی توصیه نمی شود.

F.C. Tablet

Bisoprolol /Amlodipine

هشدارها و موارد احتیاط:

در هنگام مصرف این فراورده به علت امکان ایجاد سردرد، سرگیجه ، خستگی و سایر عوارض جانبی ممکن است در رانندگی و کار با ماشین آلات اختلال ایجاد شود.

در اختلالات جدی کبدی و کلیوی مقدار مصرف با توجه به صلاحدید پزشک تغییر خواهد کرد.

در صورت فراموش کردن یک وعده در اولین زمان ممکن آن را استفاده کنید اما در صورتی که زمان آن به زمان مصرف وعده بعدی نزدیک باشد از دو برابر کردن مقدار مصرفی پرهیز کنید زیرا با این کار در خطر قرار می گیرید. دارو را به طور ناگهانی قطع نکنید.

تداخلات دارویی:

در صورتی که از سایر داروها به طور همزمان با این فراورده استفاده میکنید پیش از شروع درمان پزشک خود را مطلع سازید.

استفاده از این فراورده همزمان با داروهای: وراپامیل، دیلتیازم، داروهای کنترل کننده فشار خون مرکزی مانند کلونیدین، متیل دوپا و ... توصیه نمی شود.

عوارض جانبی دارو:

عوارض شایع شامل : سردرد، سرگیجه، خواب آلودگی (به خصوص در ابتدای درمان)، تپش قلب، گرگرفتگی، دردهای شکمی و ورم مچ پا

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و تا زمان مصرف درون بسته بندی اصلی نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: فروردین ۱۴۰۵

شرکت داروسازی خوارزمی

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا جلال، بن بست داروسازی خوارزمی، پلاک ۱۱۵

کدپستی: ۱۳۸۹۷۱۶۵۱۲ تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۴۵۴۱۳-۱۷

www.kharazmipharm.com info@kharazmipharm.com