

لیتو خوارزمی

بلتیل®

محلول خوراکی برم هگزین

دسته دارویی: خلط آور

موارد و مقدار مصرف:

درمان مشکلات تنفسی ناشی از سرفه های خلط دار:

کودکان ۵-۲ سال: ۵ میلی لیتر، ۲ بار در روز.
کودکان ۱۲-۵ سال: ۵ میلی لیتر، ۴ بار در روز.
بزرگسالان: ۲۰-۱۰ میلی لیتر، ۳ بار در روز.

موارد منع مصرف:

حساسیت به برم هگزین یا هر یک از اجزای دارو

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف برم هگزین در دوران بارداری به ویژه ۳ ماهه اول بارداری پیشنهاد نمی شود. مصرف برم هگزین در دوران بارداری می بایست زیر

نظر پزشک متخصص صورت گیرد. برم هگزین در شیر ترشح می شود.

هشدارها:

هنگام مصرف دارو، از مصرف نوشیدنی های حاوی الکل خودداری نمایید.

اگر در حین مصرف دارو هر گونه راش پوستی، زخم در دهان، گلو، بینی و چشم ها مشاهده کردید، دارو را قطع کرده و سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.

احتیاط های مصرف:

برم هگزین در افراد زیر با احتیاط مصرف شود:

در افراد با سابقه ی زخم های گوارشی
در بیماران مبتلا به آسم
در افراد مبتلا به اختلالات شدید کبدی و کلیوی

تداخل های دارویی:

مصرف همزمان با داروهای ضد سرفه (کدئین)، آمپی سیلین، آموکسی سیلین، اریترومايسين

عوارض جانبی:

اختلالات گوارشی (تهوع، استفراغ، تشدید زخم گوارشی، درد در قسمت فوقانی شکم، اسهال)، افزایش سطح آمینوترانسفراز سرم، سردرد، سرگیجه، تعریق زیاد، راش های پوستی، خواب آلودگی.

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی:

فروردین ۱۳۹۸

صدای مشتری: ۰۲۱-۴۴۵۴۵۴۲۰

ATW.064/LF.02/P