

هر قرص روکشدار کلدی سایپورت® حاوی ۱۲۵۰ میلی گرم کلسیم کربنات (معادل ۵۰۰ میلی گرم المنتال) و ۲۰۰ واحد ویتامین ۲۵ است، که توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و عرضه می شود.

موارد و مقدار مصرف:

- کمبود کلسیم و ویتامین دی در بزرگسالان

- کمک به پیشگیری و درمان پوکی استخوان، نرمی استخوان، بیماری ریکت (کمبود ویتامین ۳، کلسیم و فسفات در بدن)

- کمک به پیشگیری از پوکی استخوان

بزرگسالان: روزانه ۲-۱ قرص براساس نیاز مصرف شود.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید:

- حساسیت به ویتامین ۳ و کلسیم و یا هر یک از اجزای فرآورده

در صورت بالا بودن سطح ویتامین ۲۵ بدن هیپرکلسیمی (بالا بودن کلسیم خون)، هیپرفسفاتی (بالا بودن فسفات خون)، هیپرکلسمی اوری (بالا بودن مقدار کلسیم در ادرار)

- شرایطی که باعث هیپرکلسمی اوری یا هیپرکلسمی می شود (فعالیت زیاد غده پاراتیروئید، بیماری مغز استخوان، تومور بدخیم استخوان)

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

کلدی سایپورت® در دوران بارداری و شیردهی زیر نظر پزشک معالج می تواند مصرف شود.

هشدارها:

- قبل از مصرف و در طی درمان با کلدی سایپورت®، کلسیم خون و ادرار به طور منظم ارزیابی شود.

- بین مصرف کلدی سایپورت® و فرآورده های حاوی آهن و زینک باید دو ساعت فاصله باشد.

- کلدی سایپورت® باید دو ساعت قبل یا ۶ ساعت بعد از مصرف آنتی بیوتیک های کینولون (سیپروفلوکساسین، لوفلوکساسین...) و تتراسایکلین ها (داکسی سایکلین، مینوسایکلین...) مصرف شود.

- بین مصرف کلدی سایپورت® و بیس فسفونات ها (آلندرونیت، ایپاندرونیت، زولدرونیک اسید...) باید یک ساعت فاصله باشد.

- بین مصرف کلدی سایپورت® و غذاهای غنی از اگزالیک اسید (ربواس، اسفناج، فسفات سبزی)، فیتیک اسید (همه غلات) باید دو ساعت فاصله باشد.

احتیاط های مصرف:

کلدی سایپورت® در افراد زیر با احتیاط مصرف شود:

- در بیماران با اختلال کلیوی

- در افراد با سابقه سارکوئیدوز

- در بیماران با نارسایی قلبی

- در بیماران با سنگ کلسیمی کلیه

تداخل های دارویی:

دیگوکسین، هیدروکلروتیازید، تتراسایکلین، داکسی سایکلین، مینوسایکلین، سیپروفلوکساسین، آفلوکساسین، لوفلوکساسین، جمی فلوکساسین، لووتیروکسین، کورتیکواستروئید (پردیزولون، هیدروکورتیزون، بنامتازون)، فرآورده های حاوی آهن و زینک، بیس فسفونات ها (آلندرونیت، ایپاندرونیت، زولدرونیک اسید)، ریفاکسیم، ایزونیازید، کتوکوناژول، ایتراکوناژول، دانازول، اورلیستات

نحوه مصرف:

فرآورده را بعد از غذا و با ۱ لیوان پر از آب مصرف نماید.

عوارض جانبی:

هر فرآورده به موارات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

هیپرکلسمی (افزایش مقدار کلسیم در خون)، هیپرکلسمی اوری (افزایش مقدار کلسیم در ادرار)، واکنش های آلرژیک، تشکیل سنگ کلسیمی کلیه، یبوست، نفخ، تهوع، درد شکمی، اسهال، خارش، راش پوستی، کهیر، هیپرفسفاتی (افزایش مقدار فسفات در خون)

شرایط نگهداری:

- فرآورده را در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- فرآورده را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- فرآورده را در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید.

- هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ی امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران

تاریخ آخرین بازبینی و تدوین: فروردین ۱۳۹۹



داروسازی خوارزمی
Kharazmi
 pharmaceutical Co.

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا جلال،
 پلاک ۱۱۵
 پست داروسازی خوارزمی پلاک ۱۱۵
 تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۵۴۱۳۱
 گدستی: ۱۳۸۹۱۷۱۵۱۲
 info@kharazmipharm.com - www.kharazmipharm.com