

موارد و مقدار مصرف:

دسته دارویی: آنتی هیستامین

تسکین علامتی آلرژی شامل: رنیت، کهیر مزمن و درماتیت آتوپیک

کودکان ۵-۲ سال: ۲/۵ میلی گرم دو بار در روز.

کودکان ۱۱-۶ سال: ۵ میلی گرم دو بار در روز.

کودکان ۱۷-۱۲ سال: ۱۰ میلی گرم یک بار در روز.

بزرگسالان: ۱۰ میلی گرم یک بار در روز.

موارد منع مصرف:

حساسیت به ستیریزین یا هر یک از اجزای دارو

پورفیری حاد

مصرف در بارداری و شیردهی:

بهتر است ستیریزین در دوران بارداری و شیردهی مصرف نشود، مگر زیر نظر پزشک معالج.

هشدارها:

در کودکان زیر دو سال، با احتیاط و زیر نظر پزشک مصرف شود.

در حین مصرف دارو، از نوشیدن الکل و فرآورده های حاوی الکل خودداری نمایید.

از انجام کارهایی نظیر رانندگی که احتیاج به هوشیاری دارند در طول مصرف این دارو خودداری کنید.

احتیاط های مصرف:

در بیماران با اختلالات کبدی و کلیوی

در بیماران مبتلا به صرع

تداخل های دارویی:

MAOIs (ایزوکربوکسازید، فنتلین، ترانیل سیپرومین)، تنوفیلین، ریتوناویر، کلوبازام، آب گریپ فروت، سایر داروهای آنتی

هیستامین.

عوارض جانبی:

واکنش های حساسیتی (کهیر، شوک آنافیلاکسی، آنژیوادم، راش پوستی)، خواب آلودگی کم یا بدون خواب آلودگی (وابسته به دوز)، تاری دید، خشکی دهان، اختلالات گوارشی، سردرد، احتباس ادرار، گلوکوم زاویه بسته (در بزرگسالان)، اختلالات خونی، اسپاسم ریوی، گیجی، تشنج، افسردگی، سرگیجه، عوارض اکستراپیرامیدال، کاهش فشار خون، اختلال عملکرد کبدی، تپش قلب، واکنش های حساسیت به نور، اختلالات خواب.

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی:

اردیبهشت ۱۳۹۸

مدای مشتری: ۰۲۱-۴۴۵۴۵۴۲۰