

### موارد منع مصرف:

– سابقه واکنش حساسیتی شدید به کلپرومازین و سایر ترکیبات موجود در فرآورده  
 – تضعیف مغز استخوان (پایین بودن تعداد سلول های خونی)

### مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری: مصرف این دارو در دوران بارداری تنها در صورت نیاز و تحت نظر پزشک معالج توصیه می شود. لذا در صورت تمایل به بارداری و یا باردار بودن پزشک معالج را مطلع نمایند.  
 شیردهی: دارو در شیر مادر ترشح می شود لذا مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود.

### هشدارها:

– از مصرف الکل در طول دوره درمان با سایکونورم® خودداری نمایید.  
 – این دارو ممکن است سبب بروز خواب آلودگی گردد لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل احتیاج دارد خودداری نمایید.

### موارد احتیاط:

دارو در موارد ذیل لازم است با احتیاط مصرف شود:  
 – نارسایی کبدی و کلیوی، تشنج، مشکلات قلبی – عروقی، بیماری پارکینسون، گلوکوم، کم بودن سطح کلسیم، نیهیزم و یا پتاسیم خون، دهیدراتاسیون و یا از دست دادن مقدار زیاد خون  
**تداخلات دارویی:**

قبل از شروع درمان پزشک خود را در صورت مصرف داروهای ذیل مطلع سازید:  
 باریتورت ها، گوانیدین و کلونیدین، لیتیم، کاتپوریل، انتی اسیدها، گلی بنکلامید، ساینمتیدین، متوکلوپرامید، کارامازپام، فنی توئین، ریتوناویر، تیوریدازین، هیوسین، وارفارین، الکل.

### عوارض جانبی:

خشکی بینی و دهان، مشکل در خوابیدن، پریشانی و گیجی  
 در صورت بروز عوارض جانبی پزشک خود را مطلع نمایید:  
 سفتی عضلات، لرزش، سستی در حرکت، تاری دید، تغییرات چشمی، افت فشار در وضعیت ایستادن، ناتوانی جنسی در مردان، تغییر رنگ در پوست، تغییر مزه دهان، افزایش وزن  
**شرایط و نحوه نگهداری:**

– در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نماید.  
 – دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

**ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران – ایران**  
**تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: فروردین ۱۳۹۸**

سایکونورم® ۲۵ و ۱۰۰، قرص های خوراکی روکشدار، نارنجی رنگ، گرد و محذب هستند که حاوی ۲۵ و یا ۱۰۰ میلی گرم کلپرومازین هیدروکلراید می باشند. سایکونورم® ۲۵ و ۱۰۰ در پلیسترت های ۱۰۰ عددی، در جعبه های ۱۰۰ عددی (۱۰ پلیسترت) به همراه بروشور، توسط شرکت داروسازی خوارزمی به بازار عرضه می شود.

### راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.  
 قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمایید:  
 – وجود هر گونه حساسیت – بارداری و یا شیردهی  
 – استفاده از سایر داروها – ابتلا به بیماری های دیگر  
 – اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

### موارد و مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف قرص سایکونورم® ۲۵ و ۱۰۰ بسته به شرایط بیماری و بیمار تجویز می گردد و تجویز از دوز کم شروع و در صورت نیاز توسط پزشک معالج افزایش می یابد.

### مقدار مصرف عمومی:

**اضطراب و اختلال رفتاری و روانی (سایکوز، اختلالات دو قطبی، درمان کمی در هیجانات شدید)**

بزرگسالان: ۲۵ میلی گرم سه بار در روز و یا ۷۵ میلی گرم در زمان خواب که در صورت نیاز میزان دوز دارو به مقدار ۲۵ میلی گرم روزانه قابل افزایش می باشد و بیشترین میزان دوز روزانه ۷۵-۴۰۰ میلی گرم می باشد. در بعضی بیماران بیشترین مقدار مصرف روزانه می تواند به ۱۰۰۰ میلی گرم (۱ گرم) افزایش یابد. در افراد سالخورده میزان دوز یک سوم الی نصف دوز بزرگسالان می باشد و افزایش دوز به صورت آهسته تر انجام می شود.  
 کودکان:

۵-۱ سال: ۰/۵ میلی گرم / کیلوگرم خوراکی هر ۴ الی ۶ ساعت. بیشترین مقدار دوز روزانه: ۴۰ میلی گرم می باشد.  
 ۶-۱۲ سال: یک سوم الی نصف دوز بزرگسالان. بیشترین مقدار دوز روزانه: ۷۵ میلی گرم می باشد.

### تهوع و استفراغ:

بزرگسالان: ۱۰-۲۵ میلی گرم هر ۴ تا ۶ ساعت در افراد سالخورده میزان دوز یک سوم الی نصف دوز بزرگسالان می باشد.  
 کودکان: ۰/۵ میلی گرم / کیلوگرم خوراکی هر ۴ الی ۶ ساعت. بیشترین مقدار دوز روزانه ۵ تا ۴۰ میلی گرم و تا ۱۲ سالگی ۷۵ میلی گرم می باشد.

### سکسکه های شدید:

بزرگسالان: روزانه ۵۰-۲۵ میلی گرم خوراکی هر ۶ الی ۸ ساعت

### نحوه مصرف:

دارو را راس ساعت به همراه یک لیوان آب میل نمایند و از جویدن و یا خرد کردن دارو خودداری نمایند.

از قطع مصرف دارو بدون اطلاع پزشک معالج خودداری نمایید.

– در صورت فراموشی یک نوبت دارو به محض یه یاد آوردن آن را مصرف نمایند و در صورت گذشتن بیش از ۴ ساعت از زمان مقرر، از مصرف نوبت فراموش شده خودداری نمایند و دوز بعدی را در زمان مقرر مصرف نکند.