

سیتالوپرام ۲۰

۵- مصرف در بارداری و شیردهی:

شیردهی: فرواره در شیر مادر ترشح می شود و لازم است با احتیاط و تحت نظر پزشک معالج مصرف شود.

بارداری: مصرف این دارو در خانم های باردار مطالعه نشده است. در صورت بارداری با احتمال آن قل از مصرف دارو با پزشک مشورت نمایید.

۶- هشدارها:

در بیماران قلبی مشکوک به طولانی بودن QT با احتیاط مصرف شود.

۷- موارد اختیابی:

۸- مصرف این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی شود، لذا ضمن دمان با این دارو از راندگی یا کار با ماده ایان الای که نیاز به موہسیاری کامل دارد خودداری نمایید.

۹- قطع مصرف دارو بدون اطلاع پزشک مصالح خودداری نمایید.

۱۰- این دارو در بعضی از افراد ممکن است باعث بی قراری، تحریک پذیری یا سایر فشارهای غیرعادی شود. مچیجنین در برخی از افراد ممکن است تکر و تمايل به خود گشته باشد.

۱۱- شدن افسردگی را موجب شود. در صورت مشاهده این علامت پزشک مصالح را مطلع سازید.

۱۲- همچنین این دارو در برخی افراد ممکن است سبب خواب آلودگی، اختلال در افکار و اختلال در حرکات شود.

۸- تداخلات داروهای:

قبل از شروع درمان پزشک خود را در صورت مصرف دروهای ذیل مطلع سازید:
داروستینت، دومیریدون، سیزراپراید، هیدروکسی زین، انداسترون، کوتایپین، موکسی فلوکسیپرایسین، متوكلورامید، کلوبیدوگل، اسپیرین، فینگولیمود، لیتیوم، تراامالوں، رسپریدون، آپیکسان، دالوکستین، سوریدارین، ازتریوماسین، سلکوکسب، کارودبلول، کلبرپروپارین، کارامپارازین، سایمیدین، کلوراپین.

۹- عوارض جانبی دارو:

تغییر طعم دهان، کاهش توانایی و سلیل جنسی، افزایش با کاهش ضربان قلب، گیجی، سرفه، خواب آلودگی، هیدروکسی هدان، خشکی هدان، تبوع، مستی، اختلال در خواب، درد، حکمه، اضطراب، ابریزش بینی، بیرونی، تاری، دید، گنجی، تنفس، تکر ادرار و افزایش مقدار ادرار، کاهش احساسات، کاهش حافظه، تغییر در سکل فاعلیگی، راش پوسیتی با خارش، اختلال در تنفس، سردرد، افزایش با کاهش وزن، طولانی شدن QT، کاهش فشار خون در زمان تغییر وضعیت.

۱۰- عوارض قطع مصرف دارو:

اضطراب، گیجی، عصبانیت، ترس یا لرز.

۱۱- شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳-۴ درجه سانتیگراد دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

دارو را در دسترس کودکان نگهداری شود.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: فروردین ۱۴۹۸

۲۰- میلی گرم سیتالوپرام (به صورت هیدروبروماید) می باشد و در پلیسترهای ۱۰ عددی، در جعبه های ۳۰ عددی (۳ بیلیست) به همراه برونشور، نوسته شرکت داروسازی خوارزمی تولید و بازار عرضه می شود.

۱- راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماران فعلی شنا تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا نوصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو مواد دلیل را به پزشک معالج و با دروساز اطلاع رسانی نمایید:

- وجود رگه حساسیت - بارداری و یا شیردهی

- استفاده از سایر داروها - ابتلاء به بیماری های دیگر

- اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

۲- موارد و مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف قرص سیتالوپرام ۲۰ بسته به شرایط بیماری و بیمار توسط پزشک معالج تجویز می شود.

۳- مقدار مصرف عمومی:

بد افسردگی:

- بزرگسالان: در ابتداء میلی گرم یک بار روزانه. پزشک ممکن است دوز دارو را بر حسب نیاز و به صورت تدریجی افزایش دهد. حداکثر دوز مصرفی ۴۰ میلی گرم در روز و فاصله افزایش دوز هر ۳ الی ۴ هفته می باشد.

- سالمندان: در ابتداء ۱۰-۲۰ میلی گرم یک بار روزانه. پزشک ممکن است دوز دارو را بر حسب نیاز و به صورت تدریجی افزایش دهد. حداکثر دوز مصرفی ۳۰ میلی گرم در روز می باشد.

۴- ضد اضطراب:

- بزرگسالان: در ابتداء میلی گرم روزانه. پزشک ممکن است دوز دارو را بر حسب نیاز و به صورت تدریجی بین ۲۰-۳۰ میلی گرم افزایش دهد. حداکثر دوز مصرفی ۴۰ میلی گرم در روز و فاصله افزایش دوز هر ۳ الی ۴ هفته می باشد.

- سالمندان: در ابتداء ۱۰ میلی گرم یک بار روزانه. پزشک ممکن است دوز دارو را بر حسب نیاز و به صورت تدریجی افزایش دهد. حداکثر دوز مصرفی ۳۰ میلی گرم در روز می باشد.

۵- توجه:

- در بیماران مبتلا به نارسایی کبدی دوز شروع کمتر خواهد بود و حداکثر دوز روزانه ۲۰ میلی گرم می باشد.

۳- نحوه مصرف:

- در درمان را کامل کنید و دارو را رس اس ساعت به همراه یک لیوان آب میل نمایید.

- دارو را می توانید همراه یا بدون غذا میل نمایید.

۴- از قطع مصرف دارو بدون اطلاع پهلوی مصالح خودداری نمایید.

۵- از زمان شروع مصرف تا شروع بهبودی ممکن است ۴ هفته به طول انجامد. جهت بررسی روند بهبودی لازم است که به طور منظم به پزشک خود مراجعت کنید. لذا ممکن است محصور به مصرف دارو به مدت ۶ ماه با پیشتر باشد.

۶- موارد منع مصرف:

- مشکلات قلبی (طولانی بودن QT)

