

۷- موارد احتیاط:

در صورت ابتلا به هر یک از حالت های ذیل قبل از مصرف دارو پزشک معالج خود را مطلع نماید:

- مصرف این فرآورده در افراد بین ۱۲ الی ۱۸ سال تنها زیر نظر پزشک توصیه می گردد.
- در صورتی که بعد از چند روز، بهبودی در درد شما حاصل نشد به پزشک خود اطلاع دهید.
- اختلال عملکرد کبدی: بیماریانی که دچار آسیب کبدی هستند یا از داروهای القا کننده آنزیم های کبدی استفاده می نمایند، می بایست در مصرف این فرآورده احتیاط کنند، زیرا این دارو باعث افزایش خفیف آنزیم های کبدی می شود.

- در سابقه کاهش فشار خون

- در احتیاس ادراری و مزاجی (بیوس شدید)

- در افراد با سابقه توهم یا سایر مشکلات ذهنی شدید

۸- تداخلات دارویی:

- قبل از شروع درمان پزشک خود را در صورت مصرف داروهای ذیل مطلع سازید:
- داروهای درمان صرع (مانند فنوبیتال)، سایر ضد درد های اوبیوئید (اکسی کدون، ترامادول، متادون)، بنزودیازپین ها (دiazepam، کلونازپام، آلپرازولام)، دوکسوروبیسین، مهار کننده های مونو آمینو اکسیداز (ترانپال سیپرومین، ایزوگربو کسازید، فنلترین)، داروهای آنتی سایکوتیک (هالوپریدول، پیموزاید، تری فلوپرازین)، ضدافسردگی های ترئونینی (سرترالین، فلوکستین، پاروکستین)، متوکاربامول، تیزانیدین، باکلوفن، متوکلوپرامید، دارو های ضد التهاب غیر استروئیدی (خصوصاً آسپرین)، آنتی هیستامین ها، متوکلوپرامید، دومپریدون، کلستیرامین، وارفارین، هپارین و سایر کومارین ها.

۹- عوارض جانبی دارو:

- هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:
- خواب آلودگی، احساس سبکی سر، گیجی، سرگیجه، کوتاه شدن تنفس، تهوع، استفراغ، کاهش اشتها، ضعف ماهیچه ها، اختلالات نعوظ، واکنش های آلرژیک، احساس سراسر خستگی، بیوضی، یبوست، درد شکمی، کبیر، راش پوستی، ترومبوسیتوپنی (کاهش تعداد پلاکت های خون)، خشکی دهان، آگرانولوسیتوز (کاهش تعداد گرانولوسیت های خون)، بی خوابی، بی قراری، عصبی شدن، تشنج، توهم، سمیت کبدی، افزایش فشار خون و اختلال کلیوی.

۱۰- شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
- دارو را در بسته بندی اصلی خود و دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران
تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: آبان ۱۳۹۸

قرص خط دار کوداک فن® حاوی ۳۰۰ میلی گرم استامینوفن، ۱۵ میلی گرم کافئین و ۱۵ میلی گرم کدئین فسفات می باشد که توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می شود.

۱- راهنمای عمومی:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا تکرار به دیگران خودداری نمایید.
- قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمایید:
- وجود هر گونه حساسیت
- بارداری و یا شیردهی
- ابتلا به بیماری های دیگر
- اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

۲- موارد و مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

کاهش درد خفیف تا متوسط:

بزرگسالان (افراد بالای ۱۸ سال): ۲-۴ قرص هر ۶-۴ ساعت (حداکثر ۱۲ قرص در ۲۴ ساعت)

توجه: مصرف این فرآورده در افراد بین ۱۲ الی ۱۸ سال تنها زیر نظر پزشک معالج توصیه می گردد.

۳- نحوه مصرف:

- دارو را همراه با یک لیوان آب میل نمایید.
- چنانچه یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید به محض به یاد آوردن، آن را مصرف نمایید. ولی اگر به نوبت بعدی نزدیک بود از مصرف آن خودداری نمایید و از دو برابر کردن مصرف بعدی برای جبران نوبت فراموش شده خودداری کنید و به صورت معمول نوبت بعدی را سر وعده مصرف کنید

۴- موارد منع مصرف:

- در صورت سابقه حساسیت به هر یک از ترکیبات موجود در قرص.
- در کودکان زیر ۱۲ سال.
- در انسداد دستگاه گوارش
- در مشکلات آسمی
- در کودکان زیر ۱۸ سال که جهت درمان آپنه تنفسی انسدادی هنگام خواب، تحت جراحی حذف لوزه بوده اند.
- در الکلیسم شدید، نارسایی شدید کبد و کلیه، در ریسک تشنج.
- در بیماریانی که کدئین در بدن آن ها بصورت فوق سریع متابولیزه می شود.
- در بیماران قلبی.

۵- مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود.

۶- هشدارها:

- هنگام استفاده از این دارو از مصرف مشروبات الکلی خودداری نمایید زیرا باعث افزایش عوارض جانبی استامینوفن می گردد.
- در صورت ابتلا به بیماری های کلیوی، هیپاتیت و سایر بیماری های کبدی و فیل کتونوری در مورد مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.
- از مصرف همزمان این فرآورده با سایر داروهای حاوی استامینوفن خودداری کنید و در مورد مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.
- در صورت بروز واکنش های آلرژیک (سختی در تنفس، درد شدید شکمی، تهوع، قرمزی و خارش پوست)، دارو را قطع کرده و سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.
- از مصرف همزمان این فرآورده با سایر محصولات حاوی کافئین و یا کدئین خودداری شود.