قرص خط دار

کوتیمت سیدال®

کوتریموکسازول

Scored Tablet

Cotimet Cidal®

Co-Trimoxazole

هر عدد قرص خوراکی خط دار حاوی ۴۰۰ میلی گرم ماده موثره سولفامتوکسازول و ۸۰ میلی گرم ماده موثره تری متوپریم می باشد که در ۱۰ بلیستر ۱۰ عددی و جعبه های ۱۰۰ عددی به همراه برگه راهنمای محصول، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه میشود:

راهنمای عمومی:

این فرآورده برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک یا داروساز خود اطلاع رسانی نمایید.

-وجود هرگونه حساسیت به دارو
-بارداری و یا شیردهی
-استفاده از سایر داروها
-ابتلا به بیماری های دیگر

موارد و مقدار مصرف دارو:

مقدار و نحوه مصرف این دارو را پزشک با در نظر گرفتن عامل ایجاد کننده عفونت معین می نماید. دوز مصرفی بر اساس شرایط پزشکی، پاسخ به درمان و سایر داروهایی که مصرف می نمایید، تعیین می شود. اما مقدار و نحوه مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

جهت درمان عفونت های حاد:

بزرگسالان و کودکان ۱۲ تا ۱۸ سال: هر ۱۲ ساعت ۲ عدد قرص

کودکان ۶ تا ۱۲ سال: مقدار مصرف بر اساس وزن بدن محاسبه می شود. مقدار معمول مصرف ۲۰ تا ۳۰ میلی گرم سولفامتوکسازول و ۴ تا ۶ میلی گرم تری متوپریم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر ۱۲ ساعت می باشد.

نحوه مصرف:

چنانچه دارو را به طور منظم مصرف می کنید و در صورتی که یک نوبت مصرف آن را فراموش کردید به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید تا غلظت آن در خون و یا ادرار ثابت بماند ولی اگر تقریبا زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد از مصرف این نوبت خودداری کنید و برنامه معمول خود را ادامه دهید و مقدار مصرف را دو برابر نکنید.

دارو را همراه با یک لیوان آب مصرف کنید و در طول درمان مایعات به میزان کافی بنوشید.

موارد منع مصرف:

درصورت سابقه حساسیت به تری متوپریم یا سولفونامید

این دارو نباید برای نوزادان کمتر از سن ۲ ماه تجویز شود.

در افراد مبتلا به نارسایی شدید کلیوی

در افراد مبتلا به نارسایی شدید کبدی

کم خونی های مگالوبلاستیک ناشی از کمبود فولات

سابقه ترومبوسیتوپنی با مصرف تری متوپریم یا سولفونامیدها

مصرف در بارداری و شیردهی:

به علت عبور این دارو از جفت و ترشح آن در شیر، مصرف آن در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود.

موارد احتیاط:

وجود هر نوع حساسیت به سولفونامیدها، تری متوپریم ها، داروهای مدر تیازیدی و مواد دیگر از قبیل غذاها، مواد محافظ و رنگ ها.

در صورت ابتلا به بیماری هایی نظیر کم خونی و یا بیماری های خونی دیگر، کمبود گلوکز ۶ فسفات دهیدروژناز، بیماری های کبدی یا کلیوی و پورفیری.

این دارو می تواند موجب عوارض پوستی شدید مانند سندرم استیونس جانسون شود. در صورت مشاهده بثورات پوستی دارو را قطع و به پزشک مراجعه کنید. احتمال رخداد این عوارض در هفته اول مصرف دارو بیشتر است.

در صورت بروز عوارضی مانند تب، سرفه و تنگی نفس دارو را قطع و به پزشک مراجعه کنید.

به منظور پیش گیری از عارضه کریستالوری در طی درمان با این دارو به مقدار کافی آب بنوشید.

مصرف این دارو در افراد مبتلا به نقص آنزیمی گلوکز ۶ فسفات دهیدروژناز ممکن است موجب خونریزی شود.

تجویز این دارو در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی ملزم به تنظیم دوز است.

در افراد مسن، بیمارانی که داروهای ضد صرع مصرف می کنند، پورفیری، مشکلات تیروییدی، افراد مبتلا به سوء تغذیه و افراد مبتلا به آلرژی شدید و آسم، احتمال بروز واکنش های حساسیتی این دارو بیشتر است. بنابراین لازم است تجویز دارو در این افراد با احتیاط بیشتری صورت پذیرد.

در صورت عدم بهبودی علائم بیماری در عرض چند روز یا بدتر شدن آن ها، با پزشک خود مشورت کنید.

در طی درمان با این فرآورده از لحاظ شمارش سلول های خونی تحت نظر پزشک باشید.

تداخلات دارویی:

تداخلات دارویی ممکن است نحوه عملکرد داروهای شما را تغییر دهد یا خطر عوارض جانبی جدی را افزایش دهد. لیست زیر شامل همه تداخلات دارویی احتمالی نیست. بهتر است لیستی از تمام محصولاتی که استفاده می کنید(از جمله داروهای بدون نسخه و محصولات گیاهی) تهیه نمایید و آن را با پزشک و داروساز خود به اشتراک بگذارید. بدون تأیید پزشک، مصرف داروها را شروع، متوقف یا تغییر ندهید.

این دارو با داروهای دیورتیک تیازیدی، وارفارین، فنی توئین ، سیکلوسپورین، ریفامپین، دیگوکسین، متوترکسات، داروهای ضد بارداری خوراکی حاوی استروژن، ضد دیابت های خوراکی، اسپیرونولاکتون، آمانتادین، آنتی گونیست ها فولیک اسید

عوارض جانبی دارو:

موارد نادری از مرگ و میر ناشی از واکنشهای جدی مانند سندرم استیونس جانسون، تخریب پوستی، نکروز کبدی و عوارض خونی وکم خونی با مصرف این دارو مشاهده شده است بیمارانی که مبتلا به نقص سیستم ایمنی اکتسابی (AIDS) هستند بیشتر مستعد بروز عوارض جانبی این دارو می باشند. سایر عوارض جانبی این دارو عبارتند از:

مشکلات گوارشی از قبیل دردهای شکمی، تهوع و استفراغ، کهیر و راش پوستی، تشنج، خستگی، سرگیجه، بی خوابی، سردرد، اضطراب، سندرم استیونس جانسون، نفروتوکسیسیتی، درد های عضلانی، آریتمی قلبی، نوتروپنی، ترومبوسیتوپنی، آنژیوادم، افزایش سطح سرمی اوره و کراتینین، لوکوپنی ، آنمی مگالوبلاستیک.

مسمومیت

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک ویا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت از محیط زیست می نمایند.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: فروردین ۱۴۰۱

داروسازی خوارزمی
Kharazmi pharmaceutical Co.

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا جلالی، بن بست داروسازی خوارزمی، پلاک ۱۱۵
تلفن: ۱۷-۴۴۵۴۵۴۱۳ ۰۲۱ کدپستی: ۱۳۸۹۷۱۶۵۱۲
info@kharazmipharm.com - www.kharazmipharm.com