

موارد و مقدار مصرف:

دسته دارویی: ضد سرفه غیر اپیویدی-ضد احتقان

تسکین موقت سرفه بدون خلط همراه با رفع احتقان مجاری تنفسی فوقانی:

کودکان ۵-۲ سال : ۲/۵ میلی لیتر هر ۸-۶ ساعت. حداکثر دوز مجاز روزانه : ۱۰ میلی لیتر

کودکان ۱۱-۶ سال : ۵ میلی لیتر هر ۸-۶ ساعت. حداکثر دوز مجاز روزانه : ۲۰ میلی لیتر

کودکان بالای ۱۲ سال و بزرگسالان : ۱۰ میلی لیتر هر ۸-۶ ساعت. حداکثر دوز مجاز روزانه : ۴۰ میلی لیتر

موارد منع مصرف:

در صورت سابقه حساسیت به هر یک از

ترکیبات موجود در شربت.

در حمله حاد آسم.

در سرفه های همراه با ترشحات بیش از حد.

در بیمارانی که داروهای MAOIs مصرف

مینمایند.

در هیپرتانسیون شدید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و

شیردهی توصیه نمی شود.

هشدارها:

احتمال ایجاد رخوت و خواب آلودگی در مصرف

فرآورده وجود دارد لذا از انجام رانندگی و

کار با ماشین الاتی که نیاز به هوشیاری کامل

دارند پرهیز شود.

احتیاط های مصرف :

در بیماری عروق کرونر.

در گلوکوم.

در کودکان زیر ۲ سال فقط با نظر پزشک

مصرف شود.

تداخلات دارویی:

مهار کننده های مونوآمینواکسیداز، بتابلانر

ها، متیل دوبا، ترامادول، آمیودارون،

فلوکستین، هالوپریدول، پروپافنون،

کینیدین، تیوریدازین.

عوارض جانبی :

خواب آلودگی، گیجی، ناراحتی گوارش،

عصبانیت، اختلال خواب، ضربان قلب نا منظم،

خشکی دهان، راش پوستی.

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی:

بهمن ۱۳۹۸

صدای مشتری: ۰۲۱-۴۴۵۴۵۴۲۰