

لیتو خوارزمی برینیل®

شربت دکسترومتورفان

موارد و مقدار مصرف:

دسته دارویی: ضد سرفه غیر اویپونیدی
تسکین موقت سرفه بدون خلط:
کودکان ۵-۲ سال: ۷/۵ میلی گرم هر ۸-۶ ساعت حداکثر دوز مجاز روزانه: ۳۰ میلی گرم.
کودکان ۱۱-۶ سال: ۱۵ میلی گرم هر ۸-۶ ساعت حداکثر دوز مجاز روزانه: ۶۰ میلی گرم.
کودکان بالای ۱۲ سال و بزرگسالان: ۳۰ میلی گرم هر ۸-۶ ساعت، حداکثر دوز مجاز روزانه: ۱۲۰ میلی گرم.

موارد منع مصرف:

حساسیت به دکسترومتورفان یا هر یک از اجزای دارو.
در بیماران با سرفه های ناشی از آسم، آمفیزم و مصرف سیگار.

در بیمارانی که داروهای مهار کننده MAO (ترانیل سیپرومین، ایزوکربوکسازید و فنلزمین) مصرف می کنند.

مصرف در بارداری و شیردهی:

با احتیاط مصرف شود.

هشدار:

دکسترومتورفان می تواند باعث گیجی شود، لذا ضمن درمان با این دارو از رانندگی یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری دارد، خودداری نمایید.

احتیاط های مصرف:

در افراد با بیماری کبدی با احتیاط مصرف شود.
در کودکان زیر ۴ سال با احتیاط مصرف شود.

تداخل های دارویی:

اپریتانت، آتروپین، سیتالوپرام، اس سیتالوپرام، کلوبازام، دلوکستین، فلوکستین، فلووکسامین، پاروکستین، پوساکونازول،

سلزلین، سرتالین، ونلافاکسین، ممانتین، دونپزیل، فینگولیمود، ایزوکربوکسازید، لینزولید، فنلزمین، ترانیل سیپرومین.

عوارض جانبی:

واکنش های آنافیلاکتیک، سندرم سروتونین، تشنج، افت تنفس، ناهماهنگی عضلات، توهم، گیجی، سرگیجه، تهوع، استفراغ، خواب آلودگی خفیف.

تاریخ آخرین بازبینی و تدوین:

فروردین ۱۳۹۸

صدای مشتری: ۰۲۱-۴۴۵۴۵۴۲۰