

محلول خوراکي ديفرام[®] ديفن هيدرامين

هر ۵ ميلي ليتر از دارو حاوی ۱۲/۵ ميلي گرم ديفن هيدرامين هيدروكلرايد است، که اهنامي مصرف دارو توليد و عرضه می شود.

راهنمای عمومی:

اين دارو برای بيماری فملي شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و يا توصيه به ديگران خودداری نماييد. قبل از مصرف دارو مورد ذيل را به پزشک يا داروساز خود اطلاع رسانی نماييد. وجود هر گونه حساسيت بارداري و يا شيردهی استفاده از دارو ساير اپتلا به بيماری های ديگر

دسته دارویی: ملين

موارد و مقدار مصرف:

مقدار و نحوه مصرف اين دارو را پزشک معين می نماييد. دوز مصمرفي بر اساس شرايط پزشکی، پاسخ به درمان و ساير داروهاي که مصرف می نماييد، تعيين می شود. اما مقدار و نحوه مصرف معمول اين دارو به شرح ذيل است: در صورت عدم بهبودی علايم بيماری پس از ۷ روز از شروع درمان يا در صورت وجود تب، سردرد، سرفه و خارش های پوستي به پزشک معالج مراجعه نماييد.

دسته دارویی: آنتی هيستامين

تسكين علائمی واکنش های آلرژيک:

کودکان ۶-۲۶ سال: ۲۵ ميلي گرم، ۴-۶ بار در روز. ماکزيمم دوز روزانه: ۲۷۵ ميلي گرم.
کودکان ۱۲-۶۱ سال: ۲۵-۱۲۵ ميلي گرم، ۴-۶ بار در روز. ماکزيمم دوز روزانه: ۱۵۰ ميلي گرم.
کودکان بالای ۱۲ سال و بزرگسالان: ۵۰-۲۵ ميلي گرم، ۴-۶ بار در روز. ماکزيمم دوز روزانه: ۳۰۰ ميلي گرم.

پيشگيري و درمان تهوع ناشی از حرکت:

بزرگسالان: ۲۵-۵۰ ميلي گرم، ۳۰ دقيقه قبل از حرکت، سپس ۴-۶ بار در روز. ماکزيمم دوز روزانه: ۳۰۰ ميلي گرم.
کودکان: ۲۵-۱۲/۵ ميلي گرم هر ۸-۶ ساعت، حداکثر دوز مجاز روزانه ۳۰۰ ميلي گرم

کنترل پارکينسون و اختلالات اکستراپيراميدال ناشی از دارو:

بزرگسالان: ۲۵ ميلي گرم هر ۸ ساعت در ابتدا، سپس ۵۰ ميلي گرم هر ۶ ساعت، ماکزيمم دوز روزانه: ۳۰۰ ميلي گرم.

موارد منع مصرف:

در صورت اپتلا به يک از مشکلات ذيل، قبل از استفاده يا پزشک خود مشورت نماييد:

حساسيت به ديفن هيدرامين

در افراد با پورفيرياي حاد در بيماران دارای آسم

مصرف در بارداری و شیردهی:

در بارداری با احتياط و زیر نظر پزشک مصرف شود.

دیفن هيدرامين در دوران شیردهی مصرف نشود.

هشدار:

در کودکان زیر دو سال فقط زیر نظر پزشک متخصص مصرف شود. اين دارو ممکن است سبب خواب آلودگی و گیجی شود، لذا ضمن درمان با اين دارو، از رانندگی يا کار با دستگاه های که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نماييد.

احتیاطات:

در افراد زیر با احتياط مصرف شود:

- سابقه صرع
- هايپر تروفی پروستات (در بزرگسالان)
- گلوکوم زاويه بسته
- احتیاس ادرار
- اختلالات کبدی و کلیوی
- انسداد دستگاه گوارش
- استفاده به عنوان بی حس کننده موضعی

تداخلات دارویی:

تداخلات دارویی ممکن است نحوه عملکرد داروهای شما را تغيير دهد يا خطر عوارض جانبی جدی را افزايش دهد. لیست زیر شامل همه تداخلات دارویی احتمالي نیست. بهتر است لیستی از تمام محصولات که استفاده می کنید از جمله داروهای بدون نسخه و محصولات گیاهی تهیه نماييد و آن را با پزشک و داروساز خود به اشتراك بگذاريد. بدون تأييد پزشک، مصرف داروها را شروع، متوقف يا تغيير ندهيد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه اين عوارض در يک فرد ديده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک يا داروساز مشورت نماييد. افسردگی، رخت، گیجی، خواب آلودگی، تاري دید، تکرر ادرار، تهوع، استفراغ، اسهال، بیوسه، افزايش اشتها همراه با افزايش وزن، تشنج، تعریق زياد، درد ماهيچه، خواب رفتگی اندام ها، سرگیجه، لرزش بدن، کاهش فشار خون، يزش مو، وزوز گوش، خشکی دهان.

مسمومیت:

در صورت مصمصرف اتفاقی و بیش از مقدار توصيه شده، سريعاً به پزشک يا بيمارستان مسمومين مراجعه کنيد.

شرايط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور نگهداری و از يخ زدگی محافظت نماييد. پس از هربار مصرف در ظرف را محکم ببنديد.

دارو را از دسترس کودکان نگهداری نماييد.

هیچ فراورده يا دارویی را از طريق فاضلاب يا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ی امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نماييد. اين اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نمايد.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران- ایران
تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: بهمن ۱۴۰۰