

دیفرام®

محلول خوراکی دیفن هیدرامین

موارد و مقدار مصرف:

دسته دارویی: آنتی هیستامین

تسکین علامتی واکنش های آلرژیک:

کودکان ۶-۲ سال: ۶/۲۵ میلی گرم، ۴-۶ بار در روز. حداکثر دوز مجاز روزانه: ۳۷/۵ میلی گرم.

کودکان ۱۲-۶ سال: ۱۲/۵-۲۵ میلی گرم، ۴-۶ بار در روز. حداکثر دوز مجاز روزانه: ۱۵۰ میلی گرم.

کودکان بالای ۱۲ سال و بزرگسالان: ۵۰-۲۵ میلی گرم، ۴-۶ بار در روز. حداکثر دوز مجاز روزانه: ۳۰۰ میلی گرم.

پیشگیری و درمان تهوع ناشی از حرکت:

بزرگسالان: ۵۰-۲۵ میلی گرم، ۳۰ دقیقه قبل

از حرکت، سپس ۶-۴ بار در روز. حداکثر دوز مجاز روزانه: ۴۰۰ میلی گرم.

کنترل پارکینسون و اختلالات اکستراپیرامیدال ناشی از دارو:

بزرگسالان: ۲۵ میلی گرم هر ۸ ساعت در ابتدا، سپس ۵۰ میلی گرم هر ۶ ساعت. حداکثر دوز مجاز روزانه: ۴۰۰ میلی گرم

موارد منع مصرف:

حساسیت به دیفن هیدرامین یا هر یک از اجزای دارو

پورفیریا حاد

در بیماران دارای آسم

نباید در کودکان زیر دو سال مصرف شود، مگر زیر نظر پزشک متخصص

مصرف در بارداری و شیردهی:

منع مصرف

احتیاط های مصرف:

در افراد زیر با احتیاط مصرف شود:

سابقه صرع، هایپرتروفی پروستات (در

بزرگسالان)، گلوکوم زاویه بسته، احتباس ادرار، اختلالات کبدی و کلیوی، انسداد دستگاه گوارش و استفاده به عنوان بی حس کننده موضعی.

تداخل های دارویی:

داروهای درمان بی خوابی و اضطراب، سایر آنتی هیستامین ها.

عوارض جانبی:

افسردگی، سرگیجه، خواب آلودگی، تاری دید، احتباس ادرار، تهوع، استفراغ، تشنج، تعریق زیاد، گیجی، لرزش بدن، خشکی دهان، اسهال، یبوست، کاهش فشار خون.

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی:

بهمن ۱۳۹۷

صدای مشتری: ۰۲۱-۴۴۵۴۵۴۲۰