Enteric Coated Capsule

Duloxetine

کپسول انتریک کوتد

دلوکستین

دلوکستین ۳۰ و ۶۰، به شکل کپسول خوراکی، حاوی ۳۰ و ۶۰ میلیگرم دلوکستین می باشد که توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید، بسته بندی و به بازار عرضه می‌شود.

۱- راهنمای عمومی :

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمایید :

- وجود هر گونه حساسیت - بارداری و یا شیردهی
- استفاده از سایر داروها - ابتلا به بیماری های دیگر
- اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

۲- موارد و مقدار مصرف دارو :

مقدار مصرف کپسول دلوکستین بسته به شرایط بیماری و بیمار توسط پزشک معالج تعیین می گردد. این دارو جهت درمان افسردگی ماژور، کنترل درد نوروپاتیک در اعصاب محیطی، درمان و کنترل اختلال اضطراب (Generalized anxiety disorder) ، درمان فیبرومیالژی و درد مزمن عضلانی اسکلتی، درمان بی اختیاری در کنترل ادرار و مدفوع ناشی از استرس تجویز می گردد.

مقدار مصرف عمومی:

دولوکستین در موارد مصرف خود روزانه ۳۰ تا ۶۰ میلی گرم و حداکثر ۱۲۰ میلی گرم بسته به مورد، مصرف می شود. دارو به طور معمول روزانه به صورت تک دوز مصرف می شود.

۳- نحوه مصرف:

- دارو را به طور کامل ببلعید و از جویدن یا خرد کردن دارو خودداری نمایید.
- دولوکستین می تواند همراه یا بدون غذا مصرف شود.
- در صورت فراموشی یک نوبت دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف نمایید و در صورت گذشتن زمان طولانی از موعد مقرر ، از مصرف نوبت فراموش شده خودداری نمایید و دوز بعدی را در زمان مقرر مصرف کنید.

۴- موارد منع مصرف:

- حساسیت به دولوکستین و سایر ترکیبات
- مصرف همزمان با مهار کننده های MAO(5 روز پس از قطع مصرف دولوکستین و ۱۴ روز پس از قطع مصرف مهارکننده MAO می توان این داروها را جایگزین نمود.)
- در بیماران تحت درمان با لینزولید (افزایش خطر سندرم سروتونین).
- در بیماران مبتلا به گلوکوم با زاویه بسته که تحت درمان نمی باشند.
- در افراد الکلی
- مادران شیرده
- بیماران دیالیزی و بیماران با نارسایی کبدی

۵- مصرف در بارداری و شیردهی:

- مصرف در دوران بارداری : با احتیاط و تنها زیر نظر پزشک معالج امکان پذیر می باشد.
- مصرف در دوران شیردهی : توصیه نمی شود.

۶- هشدارها:

- قطع ناگهانی درمان با دولوکستین ممکن است همراه با سر درد و سرگیجه، بیخوابی و اسهال باشد .بنابراین از مصرف ناگهانی دارو خودداری نمایید ، و لازم است قطع مصرف دارو زیر نظر پزشک معالج و بصورت تدریجی صورت گیرد.
- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک ویا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

۷- موارد احتیاط :

در بیماران مبتلا به گلوکرم با زاویه بسته و صرع باید با احتیاط مصرف شود.

۸- تداخلات دارویی:

مصرف همزمان دولوکستین با داروهای مهار کننده ایزوفرم CYP1A2 مثل سایمتیدین و داروهای ضد باکتری فلوروکینولون(مثل سیپروفلوکساسین) ، مهارکننده های ایزوفرم CYP2A6 مثل پاروکستین (ضد افسردگی) وفلوکستین (ضد افسردگی)، داروهای مهارکننده برداشت مجدد سروتونین و ضد التهاب های غیر استروئیدی(NSAIDS) ، وارفارین ، داروهای مهارکننده باز جذب نوراپی نفرین و سروتونین، St. John's wort، مهارکننده های MAO و لینزولید.

۹- عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمائید:

- عوارض جانبی شایعی که در صورت تداوم نیاز به توجه پزشکی دارند:

تهوع، خشکی دهان، خواب آلودگی، یبوست، کاهش اشتها و تعریق شدید.

- عوارض جانبی با احتمال وقوع بسیار کم که نیاز به توجه پزشکی دارند:

تاری دید، ایجاد افکار خودکشی، تپش قلب، سمیت کبدی، کاهش میل جنسی، سوزش در موقع تخلیه مثانه.

۱۰- شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
- دارو را در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- هیچ فراورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ی امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران- ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: مرداد ۱۳۹۸

داروسازی خوارزمی
Kharazmi pharmaceutical Co.

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا جلالی،
بن بست داروسازی خوارزمی، پلاک ۱۱۵
تلفن : ۱۷-۴۴۵۴۵۴۱۳-۰۲۱ کدپستی: ۱۳۸۹۷۱۶۵۱۲
info@kharazmipharm.com - www.kharazmipharm.com