

۴- موارد منع مصرف:

در صورت وجود سابقه حساسیت به اریترومیسین و یا به هر یک از مواد تشکیل دهنده فرآورده تجزیه‌شده اریترومیسین یا از گوتامین یا دی هیدروارگوتامین، لواسانتین، سیموستاتین، سی‌آر-۱، میپوزید، آستیمیزول یا ترفنادین منع مصرف دارد.

۵- مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی جز طبق صلاح‌دید پزشک معالج توصیه نمی‌شود.

۶- هشدارها:

سپتامریت با کلاستریوم دیسیسل (CDAD) ممکن است با استفاده از اریترومیسین ایجاد شود و نیاز به مراقبت پزشکی دارد زیرا در صورت غفلت عفونت می‌تواند گسترده باشد. از مصرف اریترومیسین در بیماری‌هایی که فاصله قلبی QT طولانی دارند و در آرتیمی‌های بطنی (از جمله تورنت دی پونت)، در هیپوکالمی اصلاح نشده یا هیپومنیزیمی، در برادی کاردی کلینیکی و استفاده همزمان از داروهای کلاس IA به عنوان مثال، کینیدین، بروکایناماید یا داروهای ضد آرتیمی کلاس III (مانند آمیودارون، فلوئتاید و سوتالول) خودداری کنید. از مصرف همزمان با مپار کهنه‌های قوی CYP3A4 خودداری کنید زیرا ممکن است خطر مرگ ناگهانی قلب را افزایش دهد.

۷- موارد احتیاط:

حذر یوریکری باید از مصرف اریترومیسین اجتناب شود. سمیت دفع کبدی اریترومیسین، میبایست در هنگام استفاده از اریترومیسین در بیماران با ناراسی به‌کارشده است که اریترومیسین ممکن است ضعف عضلانی بیماران مبتلا به میاستنی گراوس را افزایش دهد. استفاده طولانی مدت یا مکرر از اریترومیسین ممکن است منجر به رشد بیش از حد باکتری‌ها و قارچ‌های غیر حساس به دارو شود، در صورت بروز عفونت ثانویه مقاوم، اریترومیسین باید قطع و درمان مناسب جایگزین شود.

۸- تداخلات دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌نمایید، پزشک خود را مطلع سازید: آمیودارون، آستیمیزول، آنترواستاتین، کابرگولین، کارمازپین، سیسپراید، سسپتالوپرام، کلاریترامیسین، کلنکسین، سیکلوسپورین، دی هیدروارگوتامین، دیلتیازم، ارگوتامین، استیلوپرام، اریومیس، فمگنیلید، فلوکازول، هالوپریدول، ایتراکانول، کتوکنازول، لفلوناماید، نیلوتینیب، کینیدین، سیندافیل، سیموستاتین، سوتالول، تاکرولیموس، ترفنادین، وراپامیل، وینکروسستین، وارفارین.

۹- عوارض جانبی دارو:

هر دارو به مراتب اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود اما در صورت بروز آن یا پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید: تهوع، استفراغ، اسهال، درد معده / گرتگی و کاهش اشتها، علائم بیماری (که مانند تهوع مداوم / استفراغ، درد ششم یا پوست، آدرار تیره، درد معده شدید / درد شکم، خستگی غیر معمول، ضعف عضلانی، اختلال در کارکرد، تاری دید، افتادگی پلک، افت شنوایی).

۱۰- شرایط نگهداری:

حارو، دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

حارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران
تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: دی ۱۳۹۸

هر عدد قرص خوراکی روکشدار خط دار اریترومیسین، حاوی ۴۰۰ میلیگرم اریترومیسین به‌عنوان ماده موثره دارویی بوده که داخل جعبه به همراه بروشور، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می‌شود.

۱- راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری ننمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمایید:

* وجود هر گونه حساسیت

* بارداری و یا شیردهی

* استفاده از سایر داروها

* اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

۲- موارد و مقدار مصرف دارو:

اریترومیسین یک ماده ضد باکتریایی ماکرولید است و در درمان عفونت‌های متعدد حساس به این دارو استفاده می‌شود که با اتصال به زیر واحد ۵۰S میکس rRNA باکتریایی عمل کرده و فرآیندهای لازم برای بقا یا تکثیر سلول باکتری را مهار می‌کند. اریترومیسین در درمان عفونت‌های مختلف در بیماران با حساسیت به بنی سلین از جمله عفونت‌های دستگاه تنفسی (مثل عفونت لژیونلا)، عفونت‌های پوستی و دهان، آتريت کامپیلوباکتر، بیماری لایم، سفلیس دوزس، پروستاتیت مزمن، پیشگیری و معالجه سیاه سرفه، پیشگیری از دفتري ثانویه در افراد غیر مصون، پیشگیری از موارد ثانویه عفونت استرپتوکوکی گروه A، پیشگیری از عفونت ذات‌الریه در فقدان طحال و یا بیماران مبتلا به بیماری سلول سانس شکل، زوآسه و آکنه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مقدار مصرف عمومی:

* دوز معمول کودکان: در عفونت‌های خفیف تا متوسط، میزان معمول مصرف اریترومیسین اتیل سوسپاتان برای کودکان: ۳۰ تا ۵۰ میلی گرم در کیلوگرم در روز به صورت دوزهای مساوی تقسیم شده هر ۶ ساعت است. برای عفونت‌های شدیدتر این مقدار ممکن است دو برابر شود.

* دوز معمول بزرگسالان: ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلی گرم اریترومیسین اتیل سوسپاتان هر ۶ ساعت دوز معمول است. با توجه به شدت عفونت ممکن است مقدار مصرف تا ۴ گرم در روز افزایش یابد. اگر دوز دو بار در روز مورد نظر باشد، ممکن است نیمی از کل دوز روزانه هر ۱۲ ساعت یک بار مصرف شود. همچنین جهت دوز متعادل به‌کار در روز، تجویز یک سوم کل دوز روزانه هر ۸ ساعت انجام پذیرد.

- برای درمان اوریتیس ناشی از C. trachomatis یا U. urealyticum: بزرگسالان ۸۰۰ میلی گرم سه بار در روز به مدت ۷ روز.

- برای درمان سفلیس اولیه: در بزرگسالان ۴۸ تا ۶۴ گرم در دوزهای تقسیم شده طی یک دوره ۱۰ تا ۱۵ روز تجویز می‌شود.

- برای آمیبیاز روده: بزرگسالان ۴۰۰ میلی گرم چهار بار در روز به مدت ۱۰ تا ۱۴ روز.

- برای استفاده در سیاه سرفه: بزرگسالان ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلی گرم در کیلوگرم در روز، به مدت ۵ تا ۱۴ روز در دوزهای تقسیم شده تجویز می‌شود.

- برای درمان بیماری لژیون: بزرگسالان روزانه ۱/۶ تا ۴ گرم در دوزهای تقسیم شده.

۳- نحوه مصرف:

حارو درجهان را کامل کنید و دارو را اس ساعت به همراه یک لیوان آب/امیامت میل نمایید.

حارو میبایست همراه با غذا و به طور کامل بلعیده شود.

از قطع یا تغییر در میزان مصرف و نحوه مصرف دارو بدون اطلاع پزشک معالج خودداری نمایید.

چنانچه جهت نوبت از مصرف دارو یا فراموش کردید به محض به یاد آوردن، آن را مصرف ننمایید.

ولی اگر به نوبت بعدی نرسید باید از مصرف آن خودداری نمایید و از دو برابر کردن مصرف بعدی برای جبران نوبت فراموش شده خودداری کنید و به صورت معمول نوبت بعدی را سر وعده مصرف کنید. از مصرف دو دوز دارو در اریترومیسین در یک زمان پرهیز ننمایید.