

هشدارها:

در بیمارانی که نارسایی کلیه متوسط تا شدید دارند.

موارد احتیاط:

این دارو ممکن است سبب ایجاد عوارض جانبی از قبیل سرگیجه، گیجی یا توهیم گردد، لذا ضمن درمان از رانندگی یا کار با ماشین آلات و فعالیت هایی که نیاز به هوشیاری و هماهنگی دارد احتیاط نمایید.

تداخلات دارویی:

پیش از مصرف همزمان این فرآورده با داروهای دیگر با پزشک خود مشورت کنید.

عوارض جانبی دارو:

عوارض شایع: یبوست

غیر شایع: خستگی، تهوع، بی اشتها، یبوست، خشکی دهان، نفخ، استفراغ، مشکلات چشایی

شرایط نگهداری:

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید. دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: شهریور ۱۴۰۱

قرص خوراکی روکشدار خط دار فاموتیدین حاوی ۲۰ یا ۴۰ میلی گرم فاموتیدین می باشد که در شرکت داروسازی خوارزمی تولید و داخل یک جعبه به همراه بروشور به بازار عرضه می شود.

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمایید:

* وجود هر گونه حساسیت * بارداری و یا شیردهی

* استفاده از سایر داروها * ابتلا به بیماری های دیگر

* اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

موارد مصرف دارو:

درمان زخم های خوش خیم معده و اثنی عشر

درمان نگهدارنده زخم های اثنی عشر

رفلاکس ازوفاجیت (بازگشت محتویات معده به مری)

نحوه مصرف:

درمان زخم های خوش خیم معده و اثنی عشر بزرگسالان ۴۰ میلی گرم روزی یک بار برای ۴ تا ۸ هفته (دارو در شب مصرف شود)

درمان نگهدارنده زخم های اثنی عشر بزرگسالان ۲۰ میلی گرم روزی یک بار (دارو در شب مصرف شود)

رفلاکس ازوفاجیت (بازگشت محتویات معده به مری) بزرگسالان ۲۰ تا ۴۰ میلی گرم دو بار در روز برای ۱۲ هفته. درمان نگهدارنده ۲۰ میلی گرم دو بار در روز.

موارد منع مصرف:

در صورت حساسیت به هریک از اجزای فرآورده. در صورت حساسیت به سایر داروهای این گروه نظیر سایمتیدین و رانیتیدین.

مصرف در بارداری و شیردهی:

از مصرف این دارو در زمان بارداری و شیردهی اجتناب کنید.