

هر ۱۰ میلی لیتر محلول خوراکی، حاوی ۲۰۰۰ میلی گرم ال کارنیتین می باشد که توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه میشود:

راهنمای عمومی:

این فرآورده برای شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

مورد مصرف:

کمک به متابولیسم چربی

مقدار و نحوه مصرف:

این فرآورده را بهتر است تحت نظر پزشک مصرف نمایید. پزشک شما مقدار دوز مصرفی را بر اساس میزان پاسخ دهی بدن فرد تنظیم می نماید.

بزرگسالان: حداکثر میزان مجاز مصرف خوراکی ال-کارنیتین تا ۳ گرم در روز می باشد.

کمبود اولیه کارنیتین به واسطه اختلالات متابولیک ذاتی در افراد:

بزرگسالان: روزانه ۲۰۰ میلی گرم/کیلوگرم به صورت منقسم در ۴-۲ دوز.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این فرآورده در دوران شیردهی و بارداری باید طبق نظر پزشک صورت گیرد.

نحوه صحیح مصرف فرآورده:

این فرآورده را می توان به تنهایی یا به صورت حل شده در نوشیدنی مثل آب میوه و یا غذای مایع مصرف نمود.

این فرآورده برای کمک به انجام بهتر تمرینات ورزشی و بهبود عملکرد بدنی بهتر است ۴-۲ ساعت قبل از ورزش مصرف گردد.

عوارض جانبی:

هر فرآورده به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن، با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده و بروز علائم زیر سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه کنید.

عوارض جانبی این محصول به ندرت دیده می شود از جمله عوارض گوارشی مانند حالت تهوع، استفراغ، درد شکم، سوزش معده، اسهال، نفخ شکم و همچنین می تواند ادرار، عرق و نفس دارای بوی ماهی باشد. برخی از عوارض جانبی دیگر عبارتند از: نقرس، واکنش آلرژیک یا التهاب مجاری هوایی و تشنج.

با کاهش دوز، تقسیم دوز به دوزهای کمتر یا حل کردن آن در مایعات، می توان عوارض گوارشی را کاهش داد.

هشدارها و موارد احتیاط:

در صورت وجود موارد زیر، قبل از مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت نمایید:

وجود هر گونه حساسیت به ال کارنیتین یا هر یک از اجزای سازنده این فرآورده در بیماران یا سابقه مشکلات نارسایی کلیوی، تشنج و کم کاری تیروئید و بیمارهای کبدی این محصول میبایست با احتیاط و تحت نظر پزشک مصرف گردد.

در صورت داشتن سابقه مشکلات کلیوی یا دیالیز

در صورت داشتن دیابت و استفاده از انسولین و یا سایر داروهای مورد استفاده در دیابت

در صورتی که بر روی رژیم غذایی با کالری کاهش یافته می باشید

در صورت عدم تحمل به قند

تداخلات دارویی:

این فرآورده با داروهای ضد انعقاد مثل وارفارین دارای تداخل می باشد.

شرایط نگهداری:

فرآورده را درون جعبه، در جای خشک، دور از نور مستقیم، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

توصیه می شود پس از هر بار مصرف محتویات هر عدد ظرف شیشه ای را به طور کامل مصرف کرده و از نگهداری باقیمانده محلول خودداری نمایید.

دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران-ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: بهمن ۱۴۰۰



داروسازی خوارزمی
Kharazmi
pharmaceutical Co.

آدرس: تهران، کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج، شهرک استقلال
خیابان جمال، پلاک ۱۱۵، صندوق پستی: ۱۳۸۹۷۱۵۶۳
تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۴۵۴۱۳
info@kharazmipharm.com - www.kharazmipharm.com