

**موارد احتیاط:**

- فنوفیبرات در افراد کلیوی با احتیاط مصرف شود.
- در افراد با کم کاری تیروئید، حتما قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید.
- در افراد با ریسک میوپاتی به همراه استاتین مصرف نشود.

**تداخل های دارویی:**

وارفارین، استاتین ها (رزوواستاتین، سیمواستاتین، آتورواستاتین، لوواستاتین)، کلشی سین، سیکلوسپورین، آزتیمپ، کلروپروامید، گلیپیزید، گلیبوریاد، اورسودنوکسی کولیک اسید (اورسودیول)، تارکولیموس.

**نحوه صحیح مصرف فنوفیبرات:**

این دارو را همراه یا بلافاصله بعد از غذا میل نمایید.

**عوارض جانبی:**

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز مشورت نمائید.

بی اشتها، تهوع، نفخ، سردرد، اسهال، یبوست، سرگیجه، درد شکمی، راش پوستی، خارش، واکنش های حساسیت به نور، آلرژی (پزشک، ریزش مو)، اختلال نعوظ، آمنی، لوکوپنی، ترومبوسیتوپنی پوریورا، افزایش ALT و AST، میوپاتی و رابدومیولیز، ناراحتی های کلیه، ژنیکوماستی، افزایش ریسک تولید سنگ های صفراوی، نوروپاتی محیطی، التهاب پانکراس، آمبولی ریوی، کهیر، سندرم استیون-جانسون، درد کمر، رینیت، اختلال تنفسی، آمنی و افزایش تعداد پلاکت ها.

**مسمومیت:**

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده، سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

**شرایط نگهداری:**

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- دارو را در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید.
- هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ی امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

**ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران**

**تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: آبان ۱۳۹۷**

هر کپسول فنوفیبرات حاوی ۲۰۰ میلی گرم فنوفیبرات می باشد که در ۳ پلیستر ۱۰ عددی و جمیع های ۱۰ عددی همراه با برگه راهنمای مصرف، داخل هر جعبه تولید و عرضه می شود.

**موارد و مقدار مصرف:**

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

**دسته دارویی:** ضد هایپرلیپیدمی (مشتق فیبریک اسید)

**درمان هایپرتری گلیسریدمی و هایپرکلسترومی یا دیس لیپیدمی ترکیبی:** ۲۰۰

میلی گرم یک بار در روز که می تواند به ۲۶۷ میلی گرم روزانه افزایش یابد.

**راهنمای های عمومی:**

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران، خودداری نمایید.
- بهتر است فنوفیبرات در کودکان مصرف نشود.

**موارد منع مصرف:**

- در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید:
- در صورت وجود هر گونه حساسیت نسبت به فنوفیبرات یا هر یک از اجزای دارو با پزشک خود مشورت نمایید.
- در صورت ابتلا به بیماری فعال کبدی شامل سیروز اولیه و ناشناخته صفراوی، بیماری کیسه صفرا، بیمارانی با اختلال شدید عملکرد کلیه و زنان شیرده در مورد مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

**مصرف در دوران بارداری و شیردهی:**

مصرف این دارو در دوران بارداری باید با احتیاط و زیر نظر پزشک صورت گیرد.

مصرف این دارو در دوران شیردهی ممنوع است.

**هشدارها:**

- در طی درمان سطح فنوفیبرات (مخصوصاً اگر همراه با استاتین ها مصرف شود)، به طور مرتب عملکرد کبدی و کراتین کیناز کنترل شود.
- در طی درمان با فنوفیبرات، تعداد سلول های خونی در طی ۱۲ ماه اول مصرف به طور مرتب کنترل شود.
- قبل از درمان، مقادیر پایه لیپید و عملکرد کبدی باید بررسی شود و در طول درمان با دارو، تست های عملکرد کبدی هر سه ماه یک بار در سال اول کنترل شود. در صورت افزایش بیش از حد آنزیم های کبدی، مصرف دارو زیر نظر پزشک قطع گردد.
- در صورت عدم دستیابی به نتیجه مطلوب در عرض دو ماه با مصرف حداکثر دوز مجاز روزانه، مصرف دارو زیر نظر پزشک قطع گردد.
- مصرف دارو ممکن است باعث ایجاد درد های عضلانی شود. در صورت مشاهده چنین حالتی موضوع را سریعاً به اطلاع پزشک خود برسانید.

