

کند، انسفالوپاتی (سمیت مغزی همراه با عدم کنترل حرکات بدن، سر گیجه، اختلال در تکلم)، تشنج، نوروپاتی محیطی (بی حسی و گرگز اندام ها) و آسیب اعصاب چشم.

مترونیدازول می تواند با تست های آزمایشگاهی زیر تداخل کند: AST، ALT، تری کلیرید، گلوکز و LDH.

موارد احتیاط:

مترونیدازول در افراد با سابقه تشنج با احتیاط مصرف شود. مصرف طولانی مدت (بیش از دو ماه) مترونیدازول می تواند باعث کولیت سودومیران و عفونت های کاندیدیایی شود. قبل از شروع درمان، در طی مصرف دارو و پس از درمان با مترونیدازول آزمایش شمارش گلبول های قرمز خون انجام شود. مترونیدازول در افراد با اختلال شدید کبدی و کلیوی با احتیاط مصرف شود.

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:
الکل و فرآورده های حاوی الکل (به دلیل ایجاد واکنش شبه دی سولفیرام)، بوسوفان، کسیتاین، دی سولفیرام، فلورواوراسیل، میندازول (از مصرف همزمان این دو دارو پرهیزید)، مایکوفنولات، فنوباریتال، فنی توئین، پرمیسیون، ریتوناویر (از مصرف همزمان این دو دارو پرهیزید)، واکسن BCG داخل مثانه، وارفارین، دیزوپیرامید، پرو کائین آمید، کینیدین، سسوتالول، کلر پرومازین، سیتالوپرام، کلاریترومایسین، پیموزاید، تیوریدازین، زیراسیدون.

نحوه مصرف مصرف دارو:

مترونیدازول برای کاهش عوارض گوارشی بهتر است همراه با غذا مصرف شود. عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:
سردرد، تهوع، التهاب واژن، سر گیجه، طعم فلزی در دهان، خارش ناحیه زینتال، درد شکمی، خشکی دهان، دیس منوره، عفونت دستگاه ادراری، عفونت باکتریایی و کاندیدیایی، علائم شبه آنفلوآنزا، التهاب گلو، آبریزش بینی، سینوزیت، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، احتقان بینی، یبوی اوری، ضعف ماهیچه ها، تب، نوتروپنی (کاهش تعداد نوتروفیل ها) بر گشت پذیر، خشکی واژن، کاهش میل جنسی، راش پوستی، سندرم استیونس-جانسون، بی اشتها، یبوست، کپهر، استفراغ، تشنج، مسمومیت؛ در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نماید.
- دارو را در بسته بندی اصلی خود نگهداری نماید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نماید.
- هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه آمحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران- ایران
تاریخ آخرین بازبینی و تدوین: خرداد ۱۳۹۷

هر قرص و رکشدار خط دار فلاژیکس® حاوی ۵۰۰ میلی گرم مترونیدازول می باشد که در پلیسه‌های ۱۰ عددی و در جعبه های ۲۰ عددی همراه با متن راهنمایی مصرف دارو مندرج داخل جعبه عرضه می شود.

موارد و مقدار مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

درمان عفونت آمیبی حاد:

کودکان: ۳۵-۵۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن روزانه در ۳ دوز منقسم برای ۱۰-۷ روز.

بزرگسالان: ۷۵۰ میلی گرم، ۳ بار در روز برای ۱۰-۵ روز.

درمان آبسه کبدی آمیبی:

بزرگسالان: ۷۵۰-۵۰۰ میلی گرم، ۳ بار در روز برای ۱۰-۵ روز.

درمان عفونت های بی هوازی:

بزرگسالان: دوز معمول، ۵۰۰ میلی گرم هر ۶ ساعت برای ۱۰-۷ روز. حداکثر دوز مجاز روزانه: ۴ گرم. (عفونت استخوان، مفاصل، دستگاه تنفسی تحتانی و اندوکار دیوم به درمان طولانی تری نیاز دارد).

درمان واژینوز باکتریایی:

بزرگسالان: ۵۰۰ میلی گرم، ۲ بار در روز برای ۷ روز.

درمان عفونت تریکوموناس:

درمان بیمار و شریک جنسی:

۱ روز درمان: دوز معمول، ۲ گرم به صورت تک دوز یا ۱ گرم، ۲ بار در روز در همان روز.

۷ روز درمان: دوز معمول، ۲۵۰ میلی گرم، ۳ بار در روز برای ۷ روز یا ۵۰۰ میلی گرم ۲ بار در روز برای ۷ روز.

درمان عفونت هلیکو باکتریایی:

بزرگسالان: درمان سه تایی: ۵۰۰ میلی گرم، ۲ بار در روز در ترکیب با کلاریترومایسین و یک PPIs برای ۱۴-۱۰ روز.

درمان ۴ تایی: ۲۵۰ میلی گرم، ۴ بار در روز در ترکیب با بیسموت، تتراسایکلین و یک PPIs برای ۱۴-۱۰ روز.

درمان عفونت دهان و دندان:

بزرگسالان: دوز معمول، ۲۵۰ میلی گرم هر ۸ ساعت برای ۱۰ روز به همراه آموکسیلین.

درمان عفونت کلوستریدیوم دیفیسیل:

بزرگسالان: ۵۰۰ میلی گرم، ۳ بار در روز برای ۱۴-۱۰ روز.

راهنمایی های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران، خودداری نمایید.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید:

- در صورت وجود هر گونه حساسیت نسبت به مترونیدازول یا هر یک از اجزای دارو یا پزشک خود مشورت نمایید.

- در طی ۳ ماهه اول بارداری در بیماران مبتلا به عفونت تریکوموناس - در افراد با سابقه مصرف دی سولفیرام در طی ۲ هفته گذشته

- در افراد با سابقه مصرف فرآورده های حاوی الکل و پروپیلن گلیکول در طی درمان و تا ۳ روز بعد از قطع مصرف مترونیدازول. زیرا مصرف همزمان باعث بروز واکنش های شبه دی سولفیرام می شود: کرامپ های شکمی، تهوع، استفراغ، سردرد، گرگرفتگی.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

از مصرف دارو در دوران بارداری (به خصوص ۳ ماهه اول) پرهیزید مگر زیر نظر پزشک معالج.

از مصرف دارو در زمان شیردهی پرهیزید مگر زیر نظر پزشک معالج.

هشدارها:

اگر در طی مصرف طولانی مدت مترونیدازول و یا مصرف در دوزهای بالا دچار عوارض زیر شدید، دارو را قطع کرده و سریعاً به پزشک مراجعه نمایید:
مننژیت غیر عفونی (علائم می تواند در طی ساعت ها بعد از مصرف دارو بروز پیدا