

FlolixCidal® Ofloxacin

فلولیکس سیدال® افلوکساسین

هر قرص فلولیکس سیدال ۲۰۰ حاوی ۲۰۰ میلی گرم افلوکساسین و هر قرص فلولیکس سیدال ۲۰۰ حاوی ۲۰۰ میلی گرم افلوکساسین می باشد که در بیلیستهای ۱۰ عددی و جعبه های ۲۰ عددی به همراه متن راهنمای مصرف، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می گردد:

راهنمای عمومی:

این فرآورده برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک یا داروساز خود اطلاع رسانی نمایید.

*وجود هر گونه حساسیت به دارو

*استفاده از سایر داروها

*ابتلا به بیماری های دیگر

مقدار و نحوه ی مصرف:

مقدار و نحوه مصرف این دارو را پزشک معین می نماید. دوز مصرفی بر اساس شرایط پزشکی، پاسخ به درمان و سایر داروهای که مصرف می نمایید، تعیین می شود. اما مقدار و نحوه مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است: این محصول را با ۲ ساعت فاصله از غذا و یا آب مصرف نمایید.

–درمان حاد برونشیت مزمن:

بزرگسالان: ۴۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت برای ۱۰ روز.

عفونت حاد التهابی لگن:

بزرگسالان: ۴۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت برای ۱۴-۱۰ روز.

عفونت حاد گنوکوکی غیر عارضه دار مجاری ادرار و دهانه رحم:

بزرگسالان: ۴۰۰ میلی گرم به صورت تک دوز.

پنومونی اکتسابی از جامعه:

بزرگسالان: ۴۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت برای ۱۰ روز.

عفونت مجاری ادراری عارضه دار:

بزرگسالان: ۴۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت برای ۱۰ روز.

عفونت مجاری ادراری و دهانه رحم ناشی از گونه های کلامیدیا

تراکوماتیس و نایسیریا گونوره آ:

بزرگسالان: ۳۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت برای ۳-۱۰ روز.

اسهال مسافرتی:

بزرگسالان: ۳۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت برای ۷ روز.

التهاب پروستات:

بزرگسالان: ۳۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت برای ۶ هفته.

التهاب مثانه غیر عارضه دار ناشی از گونه های اشرشیا کلائی و

کلیسیلیا پنومونیه:

بزرگسالان: ۲۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت برای ۳ روز.

التهاب مثانه غیر عارضه دار ناشی از سایر گونه ها:

بزرگسالان: ۲۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت برای ۷ روز.

عفونت غیر عارضه دار پوست و بافت های پوستی:

بزرگسالان: ۴۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت برای ۱۰ روز.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشـکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید:

در صورت وجود حساسیت نسبت به افلوکساسین و یا سایر فلوروکینولون ها (سیپروفلوکساسین، لوفلوکساسین و ...) و هر یک از اجزای دارو

در بیماران با طولانی بودن فاصله QT قلب (آرتمی)

در بیمارانی که سابقه بیماری التهابی پارگی تاندون ناشی از فلوروکینولون ها را دارند.

در افراد با سابقه بیماری میاستنی گراویس

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

این دارو در دوران بارداری و شیردهی فقط تحت نظر پزشک معالج مصرف گردد.

هشدارها:

این دارو ممکن است در برخی افراد باعث بروز گیجی، منگی، خواب آلودگی یا کاهش سطح هوشیاری گردد. لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری نمایید.

ایمنی و اثربخشی این دارو در کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال مشخص نشده، پس بهتر است در افراد زیر ۱۸ سال مصرف نشود.

در طول درمان با افلوکساسین، از قرار گرفتن مستقیم یا غیر مستقیم در برابر نور آفتاب یا لامپ های خورشیدی به مدت طولانی بپرهیزید و در صورت بروز علائم سمیت نوری (افتاب سوختگی شدید، قرمزی پوست، خارش یا ادم) سریعاً دارو را قطع کرده و به پزشک مراجعه نمایید.

افلوکساسین ممکن است باعث درد، التهاب، یا پارگی تاندون شود. در صورت مشاهده این علائم در دست ها، شانه ها و ساق پا، مصرف دارو را قطع نموده و سریعاً به پزشک مراجعه فرمایید. ریسک پارگی تاندون در افراد بالای ۶۰ سال، افرادی که داروهای کورتیکواستروئید مصرف می کنند و افرادی که پیوند کلیه، قلب و ریه شده اند بیشتر است.

در صورت بروز واکنش های حساسیتی (انسداد دستگاه تنفسی، کوتاه شدن تنفس، آنژیوادم)، کاهش سطح هوشیاری، تشنج، واکنش های پوستی (کهیر و ...) و سایر علائم حساسیت به دارو، دارو را قطع کرده و سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.

در طول مصرف دارو اگر دچار نوروپاتی شدید، دارو را قطع کرده و به پزشک مراجعه نمایید.

موارد احتیاط:

افلوکساسین در افراد زیر با احتیاط مصرف شود:

در افراد با سابقه بیماری های کبدی و کلیوی

در بیماران با سابقه تشنج و صرع، با سابقه بیماری های اعصاب و روان و افرادی که داروهایی مصرف می کنند که آستانه شروع تشنج را کم می کند.

بیماران با سابقه اتریت روماتوئید و بیماران با سابقه سیفلیس

در بیماران مبتلا به دیابت که داروهای کاهش دهنده قند خون مصرف می کنند.

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم و منیزیم (افلوکساسین را حداقل ۲ ساعت قبل یا ۶ ساعت بعد مصرف نمایید.) و اکسن BCg داخل مثانه (از مصرف همزمان بپرهیزد)، بنداموستین، داروهای کاهنده قند خون، نمک های کلسیم، کلوزاپین، دلوکستین (از مصرف همزمان بپرهیزد)، کورتیکواستروئیدها (بنامتازون، دگزامتازون و ...)، دیدانوزین، داروهای افزایش دهنده فاصله QT قلب (دیزوپیرامید، پروکائین آمید، کینیدین، سوتالول، کلرپرومازین، سیتالوپرام، کارتروماکسیم، اریتروماکسیم، فلوکستین، پیموزاید، تیوریدازین)، نمک های آهن، ایوآبیریدین، نمک های منیزیم، مایکوفنولات، NSAIDs (ایبوپروفن، دیکلوفناک و ...)، پنتو کسین، پروپنسید، سولامر (افلوکساسین حداقل ۲ ساعت قبل تا ۶ ساعت بعد از مصرف سولامر مصرف شود)، سوکرالیت (افلوکساسین حداقل ۲ ساعت قبل تا ۶ ساعت بعد از مصرف سوکرالیت مصرف شود)، مشتقات تیوفیلین، تیزیتیدین، و اکسن تیوفنید، وارینکین، وارفارین، نمک های زینک.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت

بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

افزایش فشار خون، افزایش ضربان قلب، گیجی، افسردگی، سرگیجه، خستگی،

توهم، سردرد، بی خوابی، واکنش های سایکوتیک، تشنج، خواب آلودگی، خارش، راش پوستی، سندرم استیونس-جانسون، درد شکمی، یبوست، خشکی دهان، اسهال، نفخ، تهوع، استفراغ، التهاب و اژن، آنمی (کاهش گلبول های قرمز خون)، افزایش ALT و AST و آلکالین فسفاتاز (آزمی های کبدی)، کاهش سطح گلوکز خون، افزایش مقدار گلوکز در ادرار، هپاتوری (وجود خون در ادرار)، پروتئین اوری (افزایش پروتئین در ادرار)، افزایش سطح BUN خون، افزایش کراتینین سرم، اختلال بینایی، تب، واکنش های حساسیتی، درد قفسه سینه، کاهش اشتها، کاهش حس چشایی، افزایش ترشحات و اژن، التهاب کبد، تشنج، کاهش وزن، التهاب گلو، فارنژیت و مشکلات بینایی.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

دارو را در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ی امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید.
این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران
تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: شهریور ۱۴۰۰

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا جلال،
پن بست داروسازی خوارزمی، پلاک ۱۱۵
کدپستی: ۱۳۸۹۱۶۵۱۲ | تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۴۲۱۲-۱۷
info@kharazmipharma.com www.kharazmipharma.com

شرکت داروسازی
خوارزمی