



هر قرص از این دارو، حاوی ۱۰ و ۲۰ میلی گرم فلوکستین (به صورت هیدروکلراید) می باشد که در پلیسه‌های ۱۰ عددی و جعبه های ۱۰۰ عددی به همراه متن راهنمای مصرف، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می‌شود:

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری ننمائید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی کنید.

* وجود هر گونه حساسیت

* استفاده از سایر داروها

دسته دارویی:

مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین

مکانیسم اثر:

این دارو با مهار بازجذب سروتونین در سلول های سیستم عصبی مرکزی، موجب افزایش میزان سروتونین می شود.

موارد و مقدار مصرف دارو:

بزرگسالان:

-افسردگی مازور دو قطبی:

در ابتدا ۲۰ میلی گرم یک بار در روز (عصر ها) به صورت ترکیبی با داروی الازاپین (و یا سایر دارو های آنتی سایکوتیک نسل دوم) برای بیمار آغاز می شود. در صورت نیاز دوز دارو توسط پزشک افزایش می یابد.

-پر خوری عصبی:

دارو با دوز ۲۰ میلی گرم روزانه برای بیمار آغاز می شود. دوز دارو، در صورت نیاز بر اساس تحمل و پاسخ بیمار نسبت به درمان می تواند در بازه های زمانی یک هفته ای افزایش یابد.

-اختلال افسردگی مازور

در ابتدا دارو با دوز ۲۰ میلی گرم به صورت یک بار در روز برای بیمار آغاز می شود. ممکن است دوز دارو بر اساس تحمل بیمار و میزان پاسخ دهی به درمان، در بازه های زمانی یک هفته و یا بیشتر افزایش یابد. حداکثر دوز مجاز مصرف روزانه: ۸۰ میلی گرم

سالمندان: دوز ابتدایی به صورت ۱۰ میلی گرم در روز آغاز و در صورت تحمل بیمار و پس از گذشت چندین هفته می تواند ۲۰-۱۰ میلی گرم افزایش یابد. توصیه می گردد تنها در صورت بروز خواب آلودگی، فلوکستین شب ها در سالمندان مصرف شود.

اختلال وسواس اجباری

-دارو با دوز ۲۰-۱۰ میلی گرم به صورت یک بار در روز برای بیمار آغاز می شود. ممکن است دوز دارو بر اساس تحمل بیمار و میزان پاسخ دهی به درمان در بازه های زمانی یک هفته ای و یا بیشتر، ۲۰ میلی گرم افزایش یابد.

-اختلال پنیک



Scored F.C. Tablet Fluoxetine

۱۰-۵ میلی گرم به صورت یک بار در روز برای بیمار آغاز می شود. ممکن است دوز دارو بر اساس تحمل بیمار و میزان پاسخ دهی به درمان در بازه های زمانی یک هفته ای و یا بیشتر ۱۰-۵ میلی گرم افزایش یابد. دوز معمول دارو در این اختلال ۲۰-۴۰ میلی گرم می باشد.

کودکان:

-افسردگی:

کودکان ۱۲-۸ سال:

در کودکان با وزن پایین: دارو با دوز ۱۰-۵ میلی گرم به صورت روزانه آغاز و در صورت نیاز پس از گذشت چندین هفته می تواند تا دوز ۲۰ میلی گرم در روز نیز افزایش یابد.

در کودکان با وزن بالاتر: دارو با دوز ۲۰-۱۰ میلی گرم به صورت روزانه آغاز می شود. (حداکثر دوز مجاز مصرفی: ۶۰ میلی گرم در روز)

-افسردگی مرتبط با اختلال دو قطبی:

کودکان بالای ۱۰ سال و نوجوانان: دوز ابتدایی: ۲۰ میلی گرم روزانه. در صورت نیاز و تحمل بیمار دوز دارو توسط پزشک تنظیم می گردد.

-اختلال وسواس اجباری:

کودکان با وزن پایین: دوز ابتدایی ۱۰-۵ میلی گرم روزانه. در صورت نیاز ممکن است پس از گذشت چندین هفته دوز دارو افزایش یابد. دوز معمول روزانه: ۳۰-۲۰ میلی گرم می باشد.

کودکان با وزن بالا تر و نوجوانان: دوز ابتدایی ۱۰ میلی گرم یک بار در روز. دوز دارو می تواند پس از گذشت هفته به ۲۰ میلی گرم روزانه افزایش یابد. در صورت نیاز پزشک می تواند دوز دارو را تدریجاً افزایش دهد.

نحوه مصرف:

فلوکستین را میتوان همراه و یا بدون غذا مصرف نمود.

موارد منع مصرف:

-در صورت حساسیت به فلوکستین

-در صورت مصرف همزمان با دارو های مهار کننده مونو آمین اکسیداز

-در صورت شروع مصرف همزمان در بیماران تحت درمان با داروهای لینزولید و یا متیلن بلو ترکیبی

-مصرف همزمان با دارو های پیموزاید و یا تیوریدازین (تیوریدازین بهتر است تا ۵ هفته پس از قطع فلوکستین برای بیمار آغاز نشود).

هشدار ها:

-این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی شود. لذا ضمن درمان از رانندگی و یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری ننمائید.

-در صورت بروز اریتمی بطنی همراه با مصرف فلوکستین دارو را قطع و سریعاً به پزشک مراجعه نمائید.

-قطع داروی فلوکستین می تواند موجب بروز عوارض سندرم قطع من جمله:

سرگیجه، لرزش، سردرد های حساس به نور، بیخوابی و احساس مور مور شدن، تهوع،

اسهال، اختلال بینایی، گیجی و خواب آلودگی، تحریک پذیری و اضطراب گردد. لذا قطع این دارو حتماً باید تحت نظر پزشک و تدریجی (بر اساس دوز درمانی و مدت زمان مصرف دارو) صورت گیرد.

احتیاطات مصرف:

این دارو در بیماران زیر با احتیاط مصرف گردد:

-در بیماران مبتلا به سندرم QT طولانی، وجود سطوح پایین پتاسیم و منیزیم خون، بیماران دارای سابقه سکته قلبی، نارسایی قلبی و آریتمی
-در صورت مصرف داروهای ضد پلاکت و یا ضد انعقاد (رقیق کننده خون)
-افراد بالای ۵۰ سال (به دلیل افزایش ریسک بروز شکستگی استخوان همراه با این دارو)

-بیماران با سابقه تشنج و یا وجود پیش آگهی بروز تشنج مانند آسیب مغزی و یا الکلیسم

-بیماران سالمند (این دارو میتواند موجب آریته شدن، اختلال در خواب و تحریک پذیری در این افراد گردد)

-بیماران مبتلا به نارسایی کبدی و کلیوی

بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی تنها منوط به تجویز پزشک می باشد.

تداخل دارویی:

فلوکستین میتواند با برخی داروها، تداخل دارویی داشته باشد. برخی از این موارد در ذیل اشاره شده است:

آپروستینیب، تیوریدازین، اورو کیناز، دکسوروسیرین، لینزولید، متیلن بلو، پیموزاید، داروهای مهار کننده آنزیم مونو آمین اکسیداز (مانند ساژیلین)، الککل، آتوموکستین، سیلاستازول، سیتالوپرام، تترانازین، دکسترومتورفان، متوکلوپرامید، ریسپریدون، داروهای ضد اسهال (مانند لوبریپروستیل و...)، تاموکسیفن، دارای های ضد التهاب غیر استروئیدی، داروهای کاهش دهنده قند خون، داروهای آنتی سایکوتیک، داروهای رقیق کننده خون (مانند: اسپیرین، وارفارین، ایکس-سابان، دایکاتران، رپوروار کسپابان، انوکسپابان، هپارین)، داروهای مورد استفاده در بیماری های اعصاب (مانند: کلونازپام، هالوپریدول، کلوزاپین، کاربامازپین، فنی توئین، پرفناتازین، اربیپرازول)

عوارض جانبی:

هر دارو به موارات اثرات مطلوب درمانی، می تواند باعث بروز عوارض جانبی ناخواسته ای نیز گردد، اگرچه همه افراد این عوارض را تجربه نخواهند کرد. در برخی موارد ممکن است لازم باشد پزشک مقدار داروی مصرفی شما را کاهش دهد و یا درمان را قطع کند. لیست عوارض جانبی در ذیل شرح داده شده است:

عوارض جانبی جدی:

-سندرم سرنوئین: این عارضه همراه است با علائمی چون: اضطراب، گیجی، توهم، گرفتگی و پرش عضلانی، سختی عضلات، افزایش ضربان قلب، لرزش، تنفس سریع و کم عمق

-فلوکستین می تواند موجب بروز اختلالات جنسی چون: تاخیر در انزال، اختلال در ارگاسم، آنورگاسمیا، اختلال در نعوظ، کاهش میل جنسی و پریاپیسم در بیماران گردد. در این خصوص پزشک می تواند دوز درمانی را کاهش و یا دارو را برای مدتی قطع نماید.

-چنانچه در حین مصرف این دارو دچار علائمی چون: درمانیت، آنژیوادم، سندرم استیون جانشون و یا نکروز سمی ایدرم شدید به پزشک خود اطلاع دهید.

-فلوکستین می تواند موجب بروز گلوکوم زاویه بسته همراه با علائمی چون درد چشمی، تورم و قرمزی چشم و تغییر در بینایی گردد.

-مصرف داروهای ضد افسردگی می تواند موجب بروز افکار خودکشی در کودکان و افراد جوان (۱۸-۲۴ سال) گردد.

شایع (بیش از ۱۰ درصد):

کاهش میل جنسی، بی اشتها، اسهال، تهوع، خشکی دهان، اضطراب، خواب آلودگی، سردرد، بی خوابی، عصبی شدن، خیمازه کشیدن، لرزش، ضعف و بی حالی، فارینیت

شایع (۱۰-۱ درصد):

درد قفسه سینه، افزایش فشار خون، افزایش ضربان قلب، طولانی شدن فاصله QT قلب، تعریق بیش از حد، کپهر و ضایعات پوستی، خونریزی های شعله قاعدگی، افزایش تشنگی، کاهش وزن، بیوست، سوء هاضمه، تغییر حس چشایی، افزایش اشتها، نفخ، استسراف، اختلال در انزال، افزایش دفعات دفع ادرار، خواب های غیر طبیعی، آریته شدن، اختلال در حافظه، سرگیجه، اختلال در بینایی، وزوز گوش، خون بزی از بینی و سندرم شبه آنفلانزا

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و به دور از نور و رطوبت نگهداری نماید.

دارو را در دور دسترس کودکان نگهداری کنید.

دارو را بعد از گذشتن تاریخ انقضا آن مصرف نکنید.

هیچ دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزد. از داروساز خود در مورد نحوه امحاء آن سوال کنید. این اقدامات به حفاظت از محیط زیست کمک می کند.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران- ایران

تاریخ آخرین بازبینی و تدوین: اسفند ۱۴۰۳

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا جلال،
پن بست داروسازی خوارزمی، پلاک ۱۱۵
کدپستی: ۱۳۸۷۱۶۵۱۲ | تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۴۴۵۱۲
www.kharazmipharm.com | info@kharazmipharm.com

شرکت داروسازی
خوارزمی