

Gemflo® 320

Gemifloxacin

بیماران با مشکلات الکتریکی (هایپو کالمی و هایپو منیزمی) اصلاح شده و همپستور در مصرف همزمان با دارو های دارای اثریتی از قبیل کینیدین، پروکاین آمید، آمیدادرون، سوتالول، بلمت، ازدیاد ریسک اریتمی پدید می آید. (Torsade de pointes) خودداری شود. -جیمی فلوکسازین در بیماری های CNS مثل صرع و همپستور در افراد مستعد تشنج با احتیاط مصرف شود.

-سایتوتیک کردن بیمار جنس درمان با این دارو از بابت اسهال ناشی شده از کلسیترویدینفیل، قطع مصرف دارو در صورت التهاب و پارگی اندودن وی بی جسی اعصاب محیطی. -خودداری از مصرف جیمی فلوکسازین در بیماران میاستی گراوس بعلت تشدید ضعف عضلات.

موارد احتیاط:

-قطع مصرف دارو در صورت رویداد راش و کپیر پوستی جنس درمان. -آلرژی های بیماران از نیاز به مصرف دقت افتاد در طی درمان با جیمی فلوکسازین و قطع دارو در صورت واکنش پوستی به نور. -مصرف مقادیر مکی از آب به منظور جلوگیری از شکل گیری ادرار بسیار تلقین یافته. -مصرف اتی اسیدهای حاوی آلومینوم و منیزیم و با فرسوفات میاستی حداقل سه ساعت قبل یا دو ساعت بعد از خوردن جیمی فلوکسازین باشد. -در صورت نیاز به مصرف داروی سولفونامید، این دارو میاستی حداقل دو ساعت بعد از مصرف جیمی فلوکسازین استفاده گردد.

تداخلات دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نماید، پزشک خود را مطلع سازید: آمیدادرون، سوتالول، بتامتازون، بیروپرون، سیزاپراید، کلوزاپین، دکزامتازون، اس سیتالوپرام، فینکلیوید، کیمپرایدگیلک بویاید، هالوپریدول، هیدروکورتیزون، انسولین، متادون، نیلوتینیب، پردنیزولون، جینیب، تیئوپراید، ترامادول، وارفارین.

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موارد اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه اثرات عوارض در حد فردی نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمائید:

راش پوستی، تهوع، اسهال، استفراغ، سردرد، درد شکمی، بی اشتها، بیوسته، درمانت، گیجی، خشکی دهان، سوء هاضمه، خشکی، نفخ، عفونت قارچی، کانتریت، التهاب دستگاه تناسلی، هایپرکالسمی، افزایش سطح الکالین فسفاتاز، افزایش در ALT و AST، افزایش در کراتین فسفاتاز، بیخوابی، لکونی، رخت، رخت حیض، ششایی، ترومبوسیتیا، کپیر، عوارض جانی، تکرار گذار بر روی سیستم عصبی مرکزی مانند: اسفردگی، افکار خودکشی، گیجی و اضطراب می باشد.

شرایط نگهداری:

-دارو، دور از دسترس کودکان نگهداری شود. -تاریخ و ردمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران
تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: خرداد ۱۴۰۰

جم فلو® ۳۲۰

جیمی فلوکسازین

هر عدد قرص خوراکی روز یکبار خط دار جم فلو®، حاوی ۳۲۰ میلیگرم جیمی فلوکسازین بعنوان ماده مؤثره دارویی بوده که به همراه متن راهنمای محصول، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه میشود.

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمائید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمائید:

- وجود هر گونه حساسیت
- بارداری و یا شیردهی
- استفاده از سایر داروها
- ابتلا به بیماری های دیگر
- اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

موارد و مقدار مصرف دارو:

جیمی فلوکسازین در دسته آنتی بیوتیک های وسیع الطیف و سنتتیک کینولونی خوراکی بوده و در درمان عفونت های تشدید یافته حاد باکتریال بروشیت مزمن ایجاد شده توسط استرئوکوکوس نومونیه، همپولیس آفلتوزا، همپولیس پارا آفلتوزا، موزازا، کاناراهالیس و همپستور در درمان پنومونی خفیف تا متوسط ایجاد شده توسط استرئوکوکوس نومونیه (شامل سوشهای مقاوم به درمان)، همپولیس آفلتوزا، موزازا، کاناراهالیس، مایکوپلاسما نومونیه، کلامیدیا نومونیا، و یا کلیسیلا نومونیا استفاده میشود.

مقدار مصرف عمومی (بالین بالای ۱۸ سال):

-عفونت های تشدید یافته حاد باکتریال بروشیت مزمن:
-یک عدد قرص ۳۲۰ میلی گرمی روزانه یکبار به مدت ۵ روز.
-عفونت های پنومونی یا شدت خفیف تا متوسط، ایجاد شده توسط استرئوکوکوس نومونیه، همپولیس آفلتوزا، مایکوپلاسما نومونیه و کلیسیلا نومونیا:
-یک عدد قرص ۳۲۰ میلی گرمی روزانه یکبار به مدت ۵ روز.
-عفونت های پنومونی یا شدت خفیف تا متوسط، ایجاد شده توسط سوشهای مقاوم به درمان کلیسیلا نومونیا، موزازا، کاناراهالیس:
-یک عدد قرص ۳۲۰ میلی گرمی روزانه یکبار به مدت ۷ روز.

نحوه مصرف:

-دوره درمان را کامل کنید و دارو را اس ساعت به همراه یک لیوان آب امیعت میل نمائید. -در موارد حساسیت به غذا و یا بدون غذا در شکل کامل بپایه شود. -از قطع یا تغییر در میزان مصرف و نحوه مصرف دارو بدون اطلاع پزشک معالج خودداری نمائید. -در صورت سمیت ناشی از مصرف دارو میاستی تشنج استفراغ، تهوع، خشکی معده و یا تشنج تشدید یافته در درمان علائم را تا بین ۱۰ تا ۱۵ روز نیاز به بیمار صورت گیرد. -چنانچه یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید به محض به یاد آوردن آن، آن را مصرف نمائید. ولی اگر به نوبت بعدی نزدیک بود از مصرف آن خودداری نمائید و از دو برابر کردن مصرف بعدی برای جبران نوبت فراموش شده خودداری کنید و به صورت معمول نوبت بعدی را سر و عدد مصرف کنید. از مصرف بیشتر از یک نوبت دارو جیمی فلوکسازین یک روز پوز هر چهزیم نمائید.

موارد منع مصرف:

در صورت وجود سابقه حساسیت به جیمی فلوکسازین، سایر آنتی بیوتیک های فلوروکینولون و یا مصرف در افراد تشنج دهنده فراورده.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود.

هشدارها:

-در صورت وجود نارسایی کلیوی شدید و کلیترنس کراتینین کمتر از ۴۰ میلی لیتر بر دقیقه نیاز به تنظیم دوز دارو میباشد. -کارایی و ایمنی مصرف جیمی فلوکسازین در کودکان و افراد زیر ۱۸ سال تایید نشده است. -اثر QT: QT طولانی: بعلت احتمال افزایش باز QT قلبی با مصرف فلوروکینولون ها در برخی بیماران، از مصرف جیمی فلوکسازین در صورت داشتن سابقه طولانی شدن زمان QT و نیز در



داروسازی خوارزمی
Kharazmi
Pharmaceutical Co.

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا جلال
پست پستی داروسازی خوارزمی، پلاک ۱۱۵
تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۶۶۱۳-۱۷
پاکستان: ۰۲۱-۶۶۴۶۶۱۳-۱۷
www.kharazmisharm.com