

هر پیمانه (۵ میلی لیتر) از شربت ۶۰ میلی لیتری گایافکس® حاوی ۱۰۰ میلی گرم گایافنژین می باشد، که در جمعه های یک عددی همراه با متن راهنمای مصرف دارو عرضه می شود.

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید. قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک یا داروساز خود اطلاع رسانی نمایید.

وجود هر گونه حساسیت به دارو

بارداری و یا شیردهی

استفاده از سایر داروها

ابتلا به بیماری های دیگر

موارد و مقدار مصرف:

دسته دارویی: اکسپکتورانت (خلط آور)

مقدار مصرف این دارو را پزشک معین می نماید. دوز مصرفی بر اساس شرایط پزشکی، پاسخ به درمان و سایر داروهایی که مصرف می نمایید، تعیین می شود. اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

درمان سرفه:

کودکان ۶ ماه تا ۲ سال: ۵۰-۲۵ میلی گرم هر ۴ ساعت. حداکثر دوز مجاز روزانه: ۳۰۰ میلی گرم.

کودکان ۲-۶ سال: ۱۰۰-۵۰ میلی گرم هر ۴ ساعت. حداکثر دوز مجاز روزانه: ۶۰۰ میلی گرم.

کودکان ۱۲-۶ سال: ۲۰۰-۱۰۰ میلی گرم هر ۴ ساعت. حداکثر دوز مجاز روزانه: ۱۲/۳ گرم.

کودکان بالای ۱۲ سال و بزرگسالان: ۴۰۰-۱۰۰ میلی گرم هر ۴ ساعت. حداکثر دوز مجاز روزانه: ۲/۴ گرم.

این دارو را با یک لیوان پر از آب مصرف نمایید.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید:

حساسیت به گایافنژین

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

این دارو را در دوران بارداری و شیردهی با احتیاط و زیر نظر پزشک مصرف ننمایید.

هشدارها:

مصرف گایافنژین ممکن است سبب خواب آلودگی و تاری دید شود، لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری نمایید.

-در کودکان زیر ۲ سال زیر نظر پزشک مصرف شود.

-در صورت مصرف این دارو، اگر تا ۷ روز علائم سرفه بهبود نیافت و یا در صورت وجود تب، راش پوستی یا سردرد مداوم با پزشک خود مشورت نمایید.

احتیاط های مصرف:

در صورت بروز سرفه های مزمن همراه با خلط (در افراد سیگاری، افراد مبتلا به آسم، برونشیت مزمن) قبل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:

خواب آلودگی، سرگیجه، سردرد، راش پوستی، کهیر، تهوع، استفراغ، ناراحتی گوارشی، درد دل، کاهش سطح اوریک اسید

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به

پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- هیچ فراورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله

های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ی امحاء آن با

دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک

زیادی به حفاظت از محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: مرداد ۱۴۰۱