



-لوپوس اریتماتوز (دیسکوئید و سیستمیک مزمن):

بزرگسالان: دوز ابتدایی، ۴۰۰ میلی گرم یک یا دو بار در روز مصرف شود. مدت مصرف چند هفته تا چند ماه است و این امر به پاسخ بیمار بستگی دارد. مقدار نگهدارنده ۴۰۰-۲۰۰ میلی گرم روزانه به مدت طولانی است.

-آرتریت روماتوئید:

بزرگسالان: دوز ابتدایی ۶۰۰-۴۰۰ میلی گرم روزانه، بعد از گذشت ۱۰-۵ روز، دوز می تواند افزایش یابد.

راهنمایی های عمومی:

-این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران، خودداری نمایید.

-این دارو ممکن است در برخی افراد باعث اختلال بینایی شود. لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری نمایید.

-این دارو در افراد با کمبود آنزیم G6PD با احتیاط و زیر نظر پزشک مصرف شود.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مـشـکـلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید:

در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به هیدروکسی کلروکین یا هر یک از اجزای دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

در صورت مصرف طولانی مدت در کودکان با پزشک معالج مشورت نمایید.

در افراد با رتینوپاتی (تغییرات بینایی و شبکیه ای) با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

این دارو در دوران بارداری و شیردهی زیر نظر پزشک مصرف شود.

هشدارها:

-معاینات مرتب چشم در ابتدای درمان و در صورت درمان طولانی مدت یا مصرف مقدار زیاد دارو هر ۳ ماه یک بار ضروری است.

-تاری دید، افزایش حساسیت به نور، کاهش شنوایی، اختلالات بارز گوارشی یا ضعف عضلانی باید پیگیری شوند.

هر قرص روکشدار خط دار روماکین® حاوی ۲۰۰ میلی گرم هیدروکسی کلروکین سولفات می باشد که در بلیستـرهای ۱۰ عددی و جعبه های ۱۰۰ عددی همراه با برگه راهنمای مصرف دارو عرضه می شود.

موارد و مقدار مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

دسته دارویی: ضد مالاریا، ضد التهاب

-درمان حملات حاد مالاریا:

بزرگسالان: دوز معمول در ابتدا ۸۰۰ میلی گرم و سپس ۴۰۰ میلی گرم در ۶-۲۴ و ۴۸ ساعت بعد.

کودکان: ابتدا با ۱۳ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن شروع شود (بیش از ۸۰۰ میلی گرم در یک دوز استفاده نشود). دوز دوم به صورت ۶/۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن پس از ۶ ساعت می باشد (بیش از ۴۰۰ میلی گرم در این دوز استفاده نشود). سپس دوز سوم با همین میزان پس از ۲۴ ساعت از دوز دوم تجویز می گردد. دوز چهارم با همین میزان پس از ۴۸ ساعت از دوز سوم به بیمار داده می شود.

-پیشگیری حمایتی از حملات مالاریا:

بزرگسالان: دوز معمول ۶/۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (از مقدار ۴۰۰ میلی گرم تجاوز نکند)، یک بار در هر هفته در یک روز مشخص. (مصرف دارو ۲ هفته قبل از ورود به منطقه اندمیک مالاریا شروع شود و به مدت ۸ هفته بعد از ترک آن محل ادامه یابد). در صورت شروع درمان بعد از تماس، مقدار دارو ۱۳ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن روزانه (از مقدار ۸۰۰ میلی گرم تجاوز نکند). در دو دوز منقسم به فاصله شش ساعت از یکدیگر مصرف شود.

کودکان: دوز معمول ۴۰۰ میلی گرم، یک بار در هر هفته در یک روز مشخص. (مصرف دارو ۲ هفته قبل از ورود به منطقه اندمیک مالاریا شروع شود و به مدت ۸ هفته بعد از ترک آن محل ادامه یابد). در صورت شروع درمان بعد از تماس، مقدار اولیه ۸۰۰ میلی گرم در دو دوز منقسم به فاصله شش ساعت از یکدیگر مصرف شود.

اگر در حین مصرف دارو دچار ورم مفصلی شدید، دارو را قطع کرده و به پزشک مراجعه نمایید.

در طی مصرف دارو به طور مرتب گلبول های خون ارزیابی شود و بیمار از نظر عوارض سرکوب مغز استخوان (آگرانولوسیتوز، آنمی، آنمی آپلاستیک، لوکوپنی و ترومبوسایتوپنی) بررسی شود.

اگر در طی درمان علائم کاردیومیوپاتی (آسیب به عضله قلب) بروز کرد، دارو را قطع کرده و سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.

موارد احتیاط:

این دارو در افراد زیر با احتیاط مصرف شود:

- بیماران با پسوریازیس

- بیماران با پورفیریا

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

آلیندازول، میندازول، پرازیکوانتل، کلرپرومازین، فلوپنازین، پرفننازین، تیوریدازین، تری فلوپرازین، متوپرولول، پروپرانولول، دیگوکسین، داپسون (سیستمیک و موضعی)، فلوکوئین (۱۲ ساعت بعد از آخرین دوز هیدروکسی کلروکین مصرف شود).

نحوه صحیح مصرف دارو:

برای کاهش عوارض گوارشی بهتر است دارو بعد از غذا مصرف شود. دارو را با یک لیوان

آب مصرف نمایید. دارو را می توان همراه با شیر مصرف کرد.

عوارض جانبی:

هر فرآورده به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن یا پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

ناهماهنگی عضلات بدن، صرع، سرگیجه، سردرد، تحریک، عصبی شدن، کابوس های شبانه، سایکوز، ریزش مو، سفید شدن مو، حساسیت به نور، کهیر، اختلال عملکرد کبدی، ریتینوپاتی با تغییر در رنگ چشم و بینایی، سختی در خواندن و دیدن لغات، ترس از نور، سندرم استیونس-جانسون، واکنش های

حساسیتی (برونکواسپاسم و آنژیوادم)، فلج عضلات، نیستاکموس، وزوز گوش.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- دارو را در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید.

- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

- هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ی امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران
تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: مرداد ۱۴۰۳