

هیوسین -ان- بوتیل بروماید

هر قرص روکش دار لانی حاوی ۱۰ میلی گرم هیوسین -ان- بوتیل بروماید است، که در پلیستر های ۱۰ عددی و در چپه های ۱۰۰ عددی همراه با برکه راهنمای مصصرف، داخل هر جعبه تولید و عرضه می شود.

موارد و مقدار مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:
دسته دارویی: آنتی کولینرژیک

-پهپود علامتی اسپاسم عضلات صاف دستگاه گوارشی یا ادراری-تناسلی:

کودکان ۱۱-۱۰ سال: ۱۰ میلی گرم، ۳ بار در روز.

کودکان ۱۷-۱۲ سال: ۲۰ میلی گرم، ۴ بار در روز.

بزرگسالان: ۲۰ میلی گرم، ۴ بار در روز.

سندرم روده تحریک پذیر:

بزرگسالان: ۱۰ میلی گرم، ۳ بار در روز. در صورت نیاز می توان دوز را به ۲۰ میلی گرم، ۴ بار در روز افزایش داد.

راهنمای های عمومی:

- این دارو برای بیماری فعلی تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران، خودداری نمایید.

- مصرف قرص هیوسین در کودکان زیر ۶ سال توصیه نمی شود.

- مصصرف این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی و تاری دید شود، لذا ضمن درمان با این دارو در صورت بروز تاری دید، از رانندگی و کار با ابزار آلات دقیق تا زمان بهبود علایم بپرهیزید.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید:
- در صورت وجود هر گونه حساسیت نسبت به هیوسین یا هر یک از اجزای دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

- در صورت ابتلا به بیماری های گلوکوم زاویه بسته، میاستنی گراویس (ضعف ماهیچه ها)، بیماری های انسدادی دستگاه گوارش، مگاکولون (بزرگ شدن کولون)، افزایش ضریان قلب، سابقه سکنه قلبی، انسداد مجاری ادراری، بیماران کلیوی، در مورد مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

- زنان شیرده

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

این دارو در دوران بارداری فقط زیر نظر پزشک معالج می تواند مصرف شود.

مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود.

هشدارها:

- از مصرف طولانی مدت این دارو بپرهیزید، زیرا به علت کم شدن بزاق دهان، خطر ابتلا به مشکلات دهان و دندان از جمله خطر بروز برفک دهان را زیاد می کند.

موارد احتیاط:

هیوسین در افراد زیر با احتیاط مصرف شود:

- در افراد با نارسایی کلیوی و کبدی

- در بیماران با نارسایی احتقانی قلب

- در بیماران با آریتمی قلبی

- در بیماران با فشار خون بالا

- در افراد با پرکاری تیروئید

- در افراد با زخم معده

- در بیماران با کولیت اولسراتیو

- در افراد با هایپر تروفی (بزرگ شدن) پروستات

- در بیماران مبتلا به آسم

- در کودکان و سالمندان

تداخلات دارویی:

نتوستیگمین، پیریدوستیگمین، کدئین، هیدروکدون، اپیراتوپوم (نیلوزار)، پتاسیم کلراید، هیدروکلروتیازید، تیوتروپوم، توپیرامات، پلاذونا، پروپانتیلن، دی سیکلومین.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

خواب آلودگی، سرگیجه، تاری دید، برطرف نخونگی، افزایش ضریان قلب (در دوزهای بالا)، سکنوب، دوبینی، خستگی، تب (به خصوص در کودکان)، سردرد، احساس ضعف، سردردگی یا هیجان ذهنی (به خصوص در سالمندان، حتی با مصرف مقادیر کم دارو)، کم شدن حافظه برای مدت کوتاه، اختلال در تکلم، لرزش بدن و بی قراری (در دوزهای بالا)، واکنش های حساسیتی (کهیر، شوک آنافیلاکسی و آنژیوادم)، افزایش فشار داخل چشم، کاهش تعریق، احتقان بینی، کم شدن ترشح شیر، خشکی پوست و دهان.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- دارو را در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- هیچ فراورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ی امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران- ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: آذر ۱۴۰۲