



۳۰

قرص روکشدار
شش‌دار

تداخل‌های دارویی:

قبل از مصرف این فرآورده، چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

فنوباریتال، فنی توئین، پریمیدون، سولفاسالازین، چای سبز، فرآورده‌های فلوئوپوراسیل، پیریمتامین

نحوه صحیح مصرف فرآورده:

فرآورده را همراه با غذا و یک لیوان آب میل نمایید.

عوارض جانبی:

هر فرآورده به موانع اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

واکنش‌های حساسیتی، کاهش سطح سرمی ویتامین B₁₂.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

فرآورده را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

فرآورده را در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید.

دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله‌های خانگی دور نریزید.

در مورد نحوه یا آمحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می‌نماید.

هر قرص روکشدار خط دار یدمادام® حاوی ۵۰۰ میکروگرم فولیک اسید و ۱۵۰ میکروگرم ید می‌باشد که در بلیسترهای ۱۰ عددی و در جعبه‌های ۳۰ عددی همراه با برگه راهنمای مصرف فرآورده عرضه می‌شود.

موارد و مقدار مصرف:

مقدار مصرف هر فرآورده را پزشک معین می‌نماید. اما مقدار مصرف معمول آن به شرح ذیل است:

کمک به تأمین فولیک اسید و ید در دوران قبل از بارداری، در طول بارداری و شیردهی این فرآورده به واسطه داشتن ید می‌تواند در کمک به بهبود و توسعه رشد مغزی، حس شنوایی و قدرت بینایی نوزادان کمک کننده باشد. هم چنین فولیک اسید موجود در مکمل یدمادام، در کاهش ریسک تولد نوزادان با نواقص مغزی و نخاعی مانند ستون فقرات شکاف دار کمک کننده می‌باشد.

بزرگسالان و خانم‌های باردار و شیرده: روزانه یک عدد قرص همراه با غذا و یک لیوان آب و یا طبق نظر پزشک مصرف نمایید.

راهنمای‌های عمومی:

این فرآورده جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نمی‌باشد.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید: در صورت وجود هر گونه حساسیت نسبت به فولیک اسید، ید یا هر یک از اجزای فرآورده با پزشک خود مشورت نمایید.

هشدارها:

از مصرف همزمان ید مام® با سایر مکمل‌های حاوی فولیک اسید یا ید، بدون تجویز پزشک خودداری نمایید.

از مصرف بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک خودداری نمایید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی زیر نظر پزشک معالج مصرف شود.

موارد احتیاط:

در افراد با آنمی پرنیشیوز (نوعی کم خونی مگالوبلاستیک است که علت آن یک واکنش خودایمنی علیه سلول‌های دوازده معده است که برای جذب ویتامین B₁₂ ضروری هستند).

در صورت ابتلا به اختلال تیروئید، جهت مصرف این فرآورده با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

این فرآورده باید در بیماران با مشکلات کلیوی با احتیاط مصرف گردد.

این فرآورده نباید در بیمارانی که به دنبال کمبود ویتامین ب_{۱۲} دچار آنمی آپلاستیک و آنمی نوروموستانیک می‌باشند، به تنهایی استفاده شود.