


ORAL DROPS
IROFANT
FERROUS SULFATE



قطره خوراکی آیروفنت®

هر ۱ میلی لیتر (۲۵ قطره) از قطره ۳۰ میلی لیتری آیروفنت® حاوی ۱۲۵/۱ میلی گرم فرس سولفات هپتا هیدرات (معادل ۲۵ میلی گرم آهن المتال) می باشد که در جعبه های یک عددی همراه با قطره چکان عرضه می شود.

موارد و مقدار مصرف:

مقدار مصرف هر فرآورده را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول آن به شرح ذیل است:

- کمک به پیشگیری از کم خونی ناشی از فقر آهن.
- ۷ تا ۱۲ ماه: روزانه ۱۱ میلی گرم معادل ۱۱ قطره یا طبق نظر پزشک.
- ۱ تا ۸ سال: روزانه ۷ میلی گرم معادل ۷ قطره یا طبق نظر پزشک.

راهنمایی های عمومی:

- برای جلوگیری از تغییر رنگ دندان، قبل از مصرف، فرآورده را با مقداری آب رقیق نمایید و قطره چکان را در انتهای زبان بچکانید.
- برای جذب بهتر آهن، بهتر است همراه با ویتامین C مصرف شود.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید:

در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به آهن یا هر یک از اجزای فرآورده با پزشک خود مشورت نمایید.

در صورت ابتلا به مشکلات هموکروماتوز، هموسیدروز، آنمی همولیتیک در مورد مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت نمایید.

در افرادی که به صورت مداوم خون دریافت می کنند.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی زیر نظر پزشک مصرف شود.

هشدارها:

— در صورت کافی بودن سطح آهن خون، از مصرف طولانی مدت و همیشگی آهن بپرهیزید.

— در طی مصرف آهن به طور منظم سطح آهن خون بررسی شود. هموگلوبین در طی ۴-۳ هفته باید به مقدار ۲۰ گرم در لیتر یا ۲ گرم در ۱۰۰ میلی لیتر افزایش یابد. زمانی که هموگلوبین به حد نرمال رسید، درمان باید به مدت ۳ ماه دیگر برای افزایش ذخایر آهن ادامه یابد.

موارد احتیاط:

این فرآورده در افراد زیر با احتیاط مصرف شود:

- در افراد با سابقه زخم گوارشی و کولیت اولسراتیو.
- بین مصرف مکمل های کلسیم، رانیتیدین، فاموتیدین، کاپتوپریل، آنتی بیوتیک های فلوروکینولون، PPIs، لووتیروکسین، آنتی بیوتیک های تتراسایکلین و این فرآورده باید چندین ساعت فاصله باشد.

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این فرآورده، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

آنتی اسید های حاوی کلسیم و آلومینیوم، نمک های کلسیم، پانکراتین، رانیتیدین، فاموتیدین، PPIs (امپرازول، پنتوپرازول، اس امپرازول، رابپرازول)، کاپتوپریل، فلوروکینولون ها (سیپروفلوکساسین، لووفلوکساسین، موکسی فلوکساسین، جمی فلوکساسین، اوفلوکساسین)، لوودوپا، لووتیروکسین، متیل دوپا، پنسیلامین، تتراسایکلین، داکسی سایکلین، مینوسایکلین.

نحوه صحیح مصرف:

آهن برای جذب بیشتر بهتر است با معده خالی مصرف شود. در صورت بروز عارضه گوارشی مثل تهوع می توان فرآورده را با غذا مصرف نمود.

عوارض جانبی:

هر فرآورده به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

تغییر رنگ دندان ها به صورت موقتی، درد شکمی (وابسته به دوز)، یبوست، اسهال، التهاب دستگاه گوارش، تهوع (وابسته به دوز)، استفراغ، تیرگی مدفوع.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

علائم مسمومیت شامل: تهوع، استفراغ، درد شکمی، اسهال، استفراغ خونی، خونریزی از مقعد. کاهش فشار خون و نکروز سلول های کبدی هم می تواند اتفاق بیافتد. کما، شوک و اسیدوز متابولیک سمیت شدید را نشان می دهد.

شرایط نگهداری:

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- فرآورده را در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید.

- فرآورده را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ی امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران- ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: مهر ۱۴۰۲

