

ایبوتاکفن® ۲۰۰/۵۰۰

ایبوپروفن ۲۰۰ / متوکاربامول ۵۰۰

F.C. Tablet

Ibotacfen® 200/500
IBUPROFEN 200 / METHOCARBAMOL 500

موارد احتیاط:

حذر بیماران دارای نارسایی قلبی، فشارخون بالا و یا سایر شرایط بالینی با احتمال احتیاط مایعات با احتیاط مصرف شود.

احتیاط در بیماران مستعد تجریکات دستگاه گوارش مانند: دیورتیکوس و یا سایر بیماری های التهابی دستگاه گوارش چون کولیت اولسراتو و بیماری کولون

احتیاط خونریزی های شکمی در افراد ۶۰ سال به بالا افراد با سابقه زخم های شکمی و یا مشکلات خونریزی، افرادی که داروهای کورتیکواستروئیدی و یا دارو های رقیق کننده خون مصرف می کنند، بیماری که دارو های ضد التهابی غیر استروئیدی مانند استیل سالیسیلیک اسید (آسپرین)، نابروکسن و سایر دارو های ضد التهابی تجویز شده را مصرف میکنند، همراه با مصرف این دارو بالا تر است.

ممکن است مصرف دارو باعث سرگیجه و خواب آلودگی گردد در نتیجه بعد از مصرف آن از رانندگی و انجام کار های که نیازمند هوشیاری کامل است، خودداری ننمایند.

از مصرف الکل در طول مصرف دارو پرهیز کنید.

در سالمندان با احتیاط بیشتری دارو مصرف شود.

در صورت داشتن موارد زیر در حین مصرف ترکیب دارویی ایبوپروفن + متوکاربامول مراقبت های خاص اعمال گردد:

در صورت سابقه بیماری های چون دیابت، فشارخون بالا، بیماری قلبی و تیرئوئید، بیماری کلیوی و یا کبدی، گلوکوم (فشار بالا چشم)، بیماری های مرتبط با انعقاد خون چون هموفیلی و یا هر گونه بیماری جدی که فرد تحت نظر پزشک باشد.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف موارد ذیل، قبل از مصرف این دارو، به پزشک و داروساز خود اطلاع دهید و از آن ها مشاوه بگیرید.

در صورتی که آسپرین مصرف می کنید این داروی ترکیبی را استفاده ننمایند.

دارو هایی که ممکن است در حین مصرف آن ها همراه این دارو تداخل ایجاد شود، شامل: استامینوفن، ضد انعقاد ها (رقیق کننده خون)، دیکتوکسین، دارو های کاشی دهنده قند خون خوراکی، انسولین ها، مدها (ادرار آور ها)، متوترکسات، لیتیم، دارو های حاوی پروتئین باندینگ بالا مانند: لووتیروکسین، پروپونید، اتنی بیوتیک ها، فنی توتین، سیکلوسپورین، بنزدیازپین، ها کورتیکواستروئید ها، سایر دارو های ضد التهابی غیر استروئیدی و دارو های مصرفی در فشار خون بالا می باشد.

عوارض جانبی دارو:

هر دارو متعاقب اثرانی که دارد، ممکن است باعث ایجاد عوارض زیر در بیمار شود. اگرچه در دوز بروز این عوارض نادر و برای همه بیماران رخ نخواهد داد.

خواب آلودگی، دشواری در خواب، بی قراری، اضطراب یا نگرانی، سر گیجه، از دست دادن حافظه، زاری دید، حرکات سریع یا غیر معمول چشم، قرمز شدن چشم همراه با گرگرفتگی بینی، احساس بیماری یا استفراغ، سوزش قلب، اختلال چشایی، لرزش، ناهماهنگی عضلانی خفیف، سردرد، تب، سوزن سوزن شدن، ضربان قلب آهسته، گرگرفتگی، ضعف یا احساس ضعف، فشار خون پایین

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران
تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: اردیبهشت ۱۴۰۰

هر قرص روکدشار حاوی مقادیر ترکیبی ذیل می باشد که توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه میشود:

۲۰۰ میلی گرم ایبوپروفن

۵۰۰ میلی گرم متوکاربامول

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری های فمائی تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری ننمایند.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمایید:

* وجود هر گونه حساسیت * بارداری و یا شیردهی

* استفاده از سایر داروها * ابتلا به بیماری های دیگر

* اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

موارد و مقدار مصرف دارو:

این دارو جهت کاشی در هایی که به دنبال اسپاسم عضلانی رخ میدهد چون: کمر درد، گرفتگی کردن، پیچ خوردگی و کشیدگی عضلات کاربرد دارد.

نحوه مصرف:

در بزرگسالان و کودکان بالای ۱۲ سال: ۱-۲ قرص هر ۶-۴ ساعت در صورت نیاز مصرف شود.

در طول ۲۴ ساعت بیش از ۶ قرص، مگر با تجویز پزشک مصرف نکنید. در صورتی که علائم نامتدرت شود یا در بیش از ۵ روز ادامه یافته، دارو را قطع کرده و به پزشک خود اطلاع دهید.

در صورتی که مصرف دوزی از دارو را فراموش کردید و زمان آن نزدیک به دوز مصرفی بعدی بود، دوز بعدی را دو برابر نکنید.

موارد منع مصرف:

منع مصرف در بیماران با سابقه حساسیت به هر یک از مواد تشکیل دهنده محصول

مصرف در بارداری و شیردهی:

در صورتی که در سه ماهه اول و دوم بارداری و یا دوران شیردهی می باشید و یا در صورتی که سایر دارو های بدون نسخه ای را مصرف میکنید، احتیاطات لازم را لحاظ کنید و قبل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

هشدارها:

در صورت داشتن موارد زیر دارو را مصرف نکنید:

حذر داشتن زخم معده یا خون ریزی از دستگاه گوارشی و یا هر گونه بیماری التهابی در سیستم گوارشی چون کولیت، بیماری کرون و ...
 در صورت مصرف آسپرین و یا دارو های ضد التهابی غیر استروئیدی مانند سایر محصولات حاوی داروی ایبوپروفن

در صورت داشتن پلپ بینی (تورم داخل بینی) و یا علائم آلرژی مانند: آسم، آنفولانسی (یک واکنش آلرژیک ناگهانی که می تواند خطر جدی برای سلامت فرد داشته باشد)، کهیر، رینیت (گرفتگی یا قرمزی بینی به دنبال آلرژی)، راش های پوستی و یا سایر علائم آلرژیک دیگر از دست دادن آب بدن به دنبال استفراغ، اسهال و یا عدم مصرف مایعات کافی
 بلافاصله قبل و بعد از جراحی قلب

در صورت داشتن بیماری جدی کبدی و کلیوی

در صورت داشتن لوپوس اریتماتوز سیستمیک (در سه ماهه سوم بارداری)

در صورتی که دچار درد و یا مشکل در دفع ادرار شدید سریعاً دارو را قطع ننمایند.