



در صورتی که ۷۵ سال یا بیشتر دارید.
 در صورتی که دچار ترکیبی از علائم درد حساسیت قرمزی یا تورم در ناحیه اندام تناسلی و یا محلی بین اندام تناسلی و مقعد شدید سریعاً با پزشک خود صحبت کنید زیرا ممکن است این علائم مربوط به عفونتی بسیار نادر ولی تهدید کننده زندگی باشد.

مصرف این فراورده به طور جزئی میتواند توانایی کار با ماشین آلات و رانندگی را تحت تاثیر قرار دهد.

در بیمارانی که به منظور انجام جراحی های مهم و یا به واسطه داشتن بیماری های حاد و جدی در بیمارستان بستری شده اند، قطع درمان با این دارو تا زمان پایدار شدن وضعیت بیمار الزامی می باشد.

تداخلات دارویی:

پیش از شروع هزمان این فراورده با سایر داروها مخصوصاً داروهای زیر پزشک معالج خود را مطلع سازید.

داروهای افزایش دهنده ادرار (دیورتیک ها)

داروهای که مقدار شکسته شدن امپاگلیفلوزین یا لیناگلیپتین را در بدن تحت تاثیر قرار میدهند مانند ریفامپیسیم که در درمان سل کاربرد دارد و داروهایی که در

کنترل تشنج کاربرد دارند مانند کاربامازپین، فنوباریتال و فنی توتین

سایر ترکیبات ضد دیابت مانند انسولین یا سولفونیل اوره ها

عوارض جانبی دارو:

عوارض جانبی این محصول میتواند شامل موارد زیر باشد:

واکنشهای حساسیتی (غیر شایع)

التهاب پانکراس (غیر شایع)

افت قند خون یا هایپوگلیسمیا (شایع)

عفونت مجرای ادراری (شایع)

از دست دادن مایعات بدن (غیر شایع)

سرفه (شایع)

تشنگی (شایع)

شرایط نگهداری:

دارو را دور از نور مستقیم و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران- ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: شهریور ۱۴۰۱

هر عدد قرص خوراکی روکشدار حاوی امپاگلیفلوزین و لیناگلیپتین به عنوان ماده مؤثره دارویی میباشد که در مقادیر ترکیبی ذیل توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه میشود:

- امپاگلیفلوزین ۱۰ میلی گرم + لیناگلیپتین ۵ میلی گرم

- امپاگلیفلوزین ۲۵ میلی گرم + لیناگلیپتین ۵ میلی گرم

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمایید:

* وجود هر گونه حساسیت

* بارداری و یا شیردهی

* استفاده از سایر داروها

* اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

موارد مصرف دارو:

هر دو ماده فعال دارویی موجود در این فراورده جهت کنترل سطح قند خون در بزرگسالان دارای دیابت نوع دوم استفاده میشود.

نحوه مصرف:

مقدار مصرف این فراورده با توجه به صلاحدید پزشک معالج تعیین میگردد.

مقدار مصرف فراورده در بیماران دارای مشکلات کلیوی و بیماران دارای نارسایی کبدی ممکن است با توجه به صلاحدید پزشک تغییر کند.

موارد منع مصرف:

در صورت هر گونه حساسیت به امپاگلیفلوزین؛ لیناگلیپتین و سایر ترکیبات جانبی این محصول و یا سایر ترکیبات این دسته دارویی مانند سیتاگلیپتین.

مصرف در بارداری و شیردهی:

در صورت بارداری یا تمایل به بارداری پیش از شروع مصرف این دارو با پزشک خود مشورت کنید در صورتی که شیرده هستید از مصرف این فراورده اجتناب کنید.

هشدارها و موارد احتیاط:

پیش از مصرف و در هنگام مصرف این فراورده با پزشک خود در خصوص موارد زیر مشورت کنید:

کارهایی که میتواند انجام دهد تا بدن دچار کمبود آب نشود.

این فراورده در درمان بیماران دیابت نوع ۱ استفاده نمیشود.

در صورتی که در مدت کوتاهی دچار کاهش وزن شدید، احساس بیماری یا دردهای شکمی، تشنگی بیش از حد معمول، تشنگ سریع و عمیق، گیجی یا خواب آلودگی و خستگی غیر معمول، یازدهم یا بوی شیرین یا حس طعم فلزی یا طعم شیرین در دهان یا بوی متفاوت در ادرار یا عرق گشاید سریعاً به پزشک یا نزدیکترین بیمارستان مراجعه کنید چون ممکن است اینها علامت کتواسیدوز دیابتی باشند.

در صورتی که از سایر ترکیبات ضد دیابت استفاده میکنید مانند سولفونیل اوره ها

در صورتی که مشکلات مربوط به پانکراس دارید یا داشته اید.

در صورتی که دچار مشکلات جدی کلیوی هستید.