

هر پیمانه (۱۵ میلی لیتر) از شریت ۴۰ میلی لیتری سیرولاکت® حاوی ۱۰ گرم لاکتولوز می باشد که همراه با پیمانه و برگه راهنمای مصرف دارو عرضه می شود.

موارد و مقدار مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

دسته دارویی: ملین

درمان یبوست:

کودکان ۱-۱۱ ماه: ۲/۵ میلی لیتر، ۲ بار در روز (با توجه به وضعیت بیمار).

کودکان ۱-۴ سال: ۲/۵ تا ۱۰ میلی لیتر، ۲ بار در روز با توجه به وضعیت بیمار.

کودکان ۵-۱۷ سال: ۲۰-۵۰ میلی لیتر، ۲ بار در روز با توجه به وضعیت بیمار.

بزرگسالان: ۱۵ میلی لیتر دو بار در روز.

انسفالوپاتی کبدی:

بزرگسالان: ۵۰-۳۰ میلی لیتر، ۳ بار در روز (با توجه به وضعیت بیمار).

راهنمایی های عمومی:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران، خودداری نمایید.

- در طی درمان با این دارو، مقدار کافی از مایعات مصرف نمایید. (تقریباً ۲ لیتر روزانه، معادل ۸-۶ لیوان)

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید:

در صورت وجود هر گونه حساسیت نسبت به لاکتوز یا هر یک از اجزای دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

در صورت ابتلا به گالاکتوزمیا (یک اختلال ژنتیکی که فرد نمی تواند گالاکتوز را هضم کند) در مورد مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

در صورت ابتلا به انسداد روده و یا بیماری التهاب حاد روده (کرون یا کولیت اولسراتیو) در مورد مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی با احتیاط و زیر نظر پزشک صورت گیرد.

هشدارها:

در صورت مصرف طولانی مدت (بیش از ۶ ماه) این دارو، مقدار الکترولیت های خون ارزیابی شود.

اگر تا ۳ روز بعد از مصرف دارو بهبودی حاصل نشد و یا علائم بیماری شدیدتر شد، به پزشک مراجعه نمایید.

(دوز مصرفی معمول) در یبوست نباید در افراد دیابتی مشکل ایجاد کند.

موارد احتیاط:

اگر عدم تحمل نسبت به لاکتوز و گالاکتوز دارید این دارو را با احتیاط مصرف نمایید.

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

هیدروکلروتیازید، استروئیدها، دیگوکسین، سولفاسالازین، مزالامین.

نحوه صحیح مصرف دارو:

لاکتولوز می تواند همراه یا بدون غذا مصرف شود.

برای کاهش عارضه تهوع، لاکتولوز را می توان همراه با آب، آب میوه و غذا مصرف نمود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

درد شکمی، کرامپ شکمی، نفخ، تهوع، استفراغ، اسهال و عدم تعادل الکترولیت های بدن (در صورت مصرف زیاد دارو).

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده و بروز علائم اسهال شدید و درد شکمی، سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ی امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران

تاریخ آخرین بازبینی و تدوین: اردیبهشت ۱۳۹۹



داروسازی خوارزمی
Kharazmi
pharmaceutical Co.

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا جلال،
بن بست داروسازی خوارزمی، پلاک ۱۱۵
تلفن: ۱۷-۱۳-۴۴۵۴۵۴ - ۰۲۱-۱۳۸۹۷۱۶۵۱۲ گدپستی:
info@kharazmipharm.com - www.kharazmipharm.com