

لیتو خوارزمی
گایافکس®
شربت گایافنزین

موارد و مقدار مصرف:

دسته دارویی:

اکسپکتورانت (خلط آور)

درمان سرفه و علائم احتقان سینه ناشی از سرماخوردگی، آنفلوآنزا یا سایر بیماریهای تنفسی:

کودکان ۶ ماه تا ۲ سال: ۵۰-۲۵ میلی گرم هر ۴ ساعت. حداکثر دوز مجاز روزانه: ۳۰۰ میلی گرم.

کودکان ۲-۶ سال: ۱۰۰-۵۰ میلی گرم هر ۴ ساعت. حداکثر دوز مجاز روزانه: ۶۰۰ میلی گرم.

کودکان ۱۱-۶ سال: ۲۰۰-۱۰۰ میلی گرم هر ۴ ساعت. حداکثر دوز مجاز روزانه: ۱/۲ گرم.

کودکان بالای ۱۲ سال و بزرگسالان: ۴۰۰-۲۰۰ میلی گرم هر ۴ ساعت. حداکثر

دوز مجاز روزانه: ۲/۴ گرم.

موارد منع مصرف:

حساسیت به گایافنزین یا هر یک از اجزا دارو

مصرف در بارداری و شیردهی:

با احتیاط مصرف شود.

هشدار:

این دارو در کودکان زیر ۲ سال فقط زیر نظر پزشک مصرف شود.

احتیاط های مصرف:

در صورت بروز سرفه های مزمن همراه با خلط (در افراد سیگاری، افراد مبتلا به آسم، برونشیت مزمن، آمفیزم) و پورفیری قبل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت کنید.

تداخلات دارویی:

تداخل دارویی خاصی در مورد مصرف این دارو گزارش نشده است.

عوارض جانبی:

سرگیجه، خواب آلودگی، سردرد، راش پوستی، تهوع، درد شکمی، استفراغ، کهیر.

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی:

تیر ۱۳۹۸

صدای مشتری: ۰۲۱-۴۴۵۴۵۴۲۰